DIニュース2016年 8月 2号

# 注射剤配合変化一覧

愛媛大学医学部附属病院薬剤部　薬品情報管理室

2016年8月1日作成

**アレビアチン、アムビゾーム、セルシン、マンニットールは、単独投与**

指定溶解液
生食 ＝ S
5%ブドウ糖液＝ T
ラクテック＝ R
注射用水＝ W

× ･･･ 配合 不可
○ ･･･ 配合 可
その他･･･※可否の基準参照
空欄･･データー無し
（ ）･･･先発品名

| | 指定溶解液 | 安定域のpH | アドナ静注 | アンカロン注 | イソゾール注 | ウロナーゼ注 | エスラックス注 | エダラボン点滴静注液「日医工」（ラジカット点滴静注） | エラスポール注 | カコージン注（イノバン） | カルチコール注 | キシロカイン注 | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」（グリセオール注） | シグマート注 | ジゴシン注 | スルバシリン注（ユナシン） | セファゾリンNa注「ニプロ」（セファメジンα） | セレネース注 | ゾシン注 | ソル・コーテフ注 | ソルダクトン注 | ソル・メルコート注（ソル・メドロール） | タンデトロン注（プロスタンディン） | テイコプラニン注「F」（タゴシッド） | デキサート注（デカドロン） | *ドブトレックス注*ドブポン注シリンジ | トラネキサム酸注（トランサミン注）「日新」 | ナファモスタット「MEEK」（フサン） | ニカルジピン注（ペルジピン注）「FY」 | 強力ネオミノファーゲンシー | ネオフィリン注 | ノルアドレナリン | パンコマイシン注「MEEK」 | ハンプ注 | ビソルボン注 | †ヒューマリンR注 | ファーストシン注 | ファモチジン注「サワイ」（ガスター） | フェンタニル注「ヤンセン」 | †プレセデックス注 | ブレドニン水溶性 | フロセミド注「テバ」（ラシックス注） | プロタノールL注 | ヘパリンNa注「モチダ」 | ヘルベッサー注 | ボスミン注 | マキシピーム注 | ミオコール注（ミリスロール） | ミダゾラム注「サンド」（ドルミカム） | ミラクリッド注 | ミルリーラ注 | メイロン静注 7% | メイロン静注 8.4% | メロペネム注「明治」（メロペン） | レペタン注 | レミナロン注（FOY） |
|---|---|---