

【金属含有薬剤と相互作用を起こすおそれのある経口剤】



分類	薬品名	一般名	金属				備考		
			Al	Mg	Fe	Ca			
血清カリウム抑制剤	カリメート（散、経口液）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム	効果減弱 ^①		/	効果減弱 ^①	添付文書・IF 併用により全身性アルカローシスなどの症状があらわれたとの報告		
	アーガメイト20%ゼリー								
	ケイキサレートDS	ポリスチレンスルホン酸ナトリウム							
甲状腺ホルモン剤	チラーチンS（散、錠）	レボチロキシンナトリウム水和物	吸収阻害 ^②	/	吸収阻害 ^②	添付文書・IF 投与間隔はできるだけ開ける			
	25mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム							
ジギタリス製剤	ジゴシン（散、錠）	ジゴキシン	吸収阻害 血中濃度低下 ^②		/	(静注) 原則併用禁忌 (内服) 併用注意			
	ハーフジゴキシン KY錠0.125								
	ラニラビッド錠							メチルジゴキシン	
肝・胆・消化機能改善剤	ウルソ顆粒	ウルソデオキシコール酸	吸収低下 ^②	/					
	ウルソデオキシコール酸錠		(AUC40%↓)						
抗アレルギー薬	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg 塩酸プソイドエフェドリン60mg	吸収低下 ^② (AUC40%↓)		/		添付文書・IF 同時服用は避けること		
	フェキソフェナジン塩酸塩錠	フェキソフェナジン塩酸塩30mg							
骨代謝改善薬	アクトネル錠	リセドロン酸ナトリウム	吸収低下 ^④		/		添付文書・IF 本剤服用後30分経ってから服用		
	リカルボン錠	ミノドロン酸水和物							
	ダイドロネ錠200	エチドロン酸二ナトリウム							
	ボンビバ錠100mg	イバンドロン酸ナトリウム水和物	吸収低下 ^④		/		添付文書・IF 服用前後2時間はあけること 添付文書・IF 本剤服用後60分経ってから服用 添付文書・IF 本剤服用後30分経ってから服用		
	ボナロンゼリー	アレンドロン酸ナトリウム水和物						吸収低下 ^③	吸収低下 ^③
	アレンドロン酸錠35mg								
止瀉剤	タンニン酸アルブミン	タンニン酸アルブミン	/		吸収阻害 (不溶塩形成)	併用禁忌!			
制酸剤、緩下剤	酸化マグネシウム(細粒、錠)	酸化マグネシウム					吸収・排泄に影響 であることあり ^{②⑥}	高カルシウム血症に注意	添付文書・IF Fe:投与間隔空けること
消化性潰瘍 胃炎治療剤	マーロックス懸濁用配合顆粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル 水酸化マグネシウム	/		吸収低下 ^⑥	高カルシウム血症に注意	添付文書・IF Fe:同時に服用させないなど慎重に投与		
HMG-CoA 還元酵素阻害剤	クレストール錠2.5mg	ロスバスタチンカルシウム					吸収低下 ^⑥ (AUC54%↓)	/	
抗てんかん薬	ガバペン錠	ガバペンチン	吸収低下 ^⑥ (AUC20%↓)	/		添付文書・IF Al、Mg含有剤から2時間以上空けて投与			
抗パーキンソン薬	イーシー・ドパール配合錠	ベンセラジド塩酸塩 レボドパ	/				吸収低下 ^③		添付文書・IF 2~3時間空けて服用
	コムタン錠	エンタカポン							
	スタレボ配合錠	エンタカポン カルビドパ水和物 レボドパ							
	ドバコール配合錠	カルビドパ水和物 レボドパ							
	メネシット配合錠								
	デュオドーパ配合経腸液								
	ドブスOD錠	ドロキシドパ							
	ドバストンカプセル	レボドパ							
抗悪性腫瘍剤	スプリセル錠	ダサチニブ水和物	吸収阻害 ^⑤		/		添付文書・IF 本剤投与前後2時間はあけること		
	エストラサイトカプセル	エストラムステンリン酸エステルナトリウム水和物						吸収低下 ^⑥	
免疫抑制剤	セルセプトカプセル	ミコフェノール酸モフェチル	吸収低下 ^⑤ (AUC17%↓)	/					

分類	薬品名	一般名	金属				備考
			Al	Mg	Fe	Ca	
抗生剤 ニューキノロン系 キノロン系	オゼックス細粒小児用15%	トスフロキサシントシル酸塩水和物	吸収低下 ^④ (AUC37%↓)	吸収低下 ^④ (AUC54%↓)	吸収低下 ^④ (AUC16%↓)	吸収低下 ^④ (AUC42%↓)	添付文書・IF 同時投与は避けるなど注意すること
	クラビット細粒10%	レボフロキサシン水和物	吸収低下 ^③ (AUC44%↓)	吸収低下 ^③ (AUC22%↓)	吸収低下 ^③ (AUC19%↓)	影響なし (AUC0.03%↓)	添付文書・IF 本剤投与後1~2時間はあけること
	レボフロキサシン(錠、OD錠)		吸収低下 ^③				
	アベロックス錠	モキシフロキサシン塩酸塩	吸収低下 ^③				添付文書・IF 本剤服用後2時間以上あけること
	グレースビット錠	シタフロキサシン水和物	吸収低下 ^③ (AUC75%↓)	吸収低下 ^③ (AUC51%↓)	吸収低下 ^③ (AUC56%↓)	吸収低下 ^③ (AUC33%↓)	
	シプロキサシン錠	塩酸シプロフロキサシン	吸収低下 ^③				
	小児用バクシダール	ノルフロキサシン	吸収阻害 ^③				
	ジェニナック錠	メシル酸ガレノキサシン水和物	吸収阻害 ^③ (AUC58%↓)	吸収阻害 ^③			
テトラサイクリン系	ビブラマイシン錠	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	吸収低下 ^③				添付文書・IF 2~4時間あけて服用すること
	アクロマイシンVカプセル	テトラサイクリン塩酸塩	吸収阻害 ^③				
	ミノサイクリン塩酸塩錠	ミノサイクリン塩酸塩	吸収阻害 ^③				
セフェム系	セフジニル(カプセル、細粒)	セフジニル	吸収低下 ^⑤		吸収阻害 ^④ (1/10に阻害)		添付文書・IF Al、Mg⇒本剤投与後2時間以上あける Fe⇒本剤投与後3時間以上あける
	パナン錠	セフボドキシムプロキセチル	吸収低下 ^⑤				同時投与は避ける
マクロライド系	ジスロマック(錠、細粒、SR)	アジスロマイシン水和物	Cmax24%↓、AUCは有意差なし ^⑤				添付文書・IF(SR除く) 投与前後2時間以上あける
抗結核薬	イスコチン錠	イソニアジド	吸収低下 ^③				添付文書・IF 本剤投与から1時間以上あける
抗真菌薬	イトラコナゾール錠	イトラコナゾール	吸収低下 ^⑥ (AUC66%↓)				
抗HIV薬	アイセントレス錠	ラルテグラビルカリウム	吸収低下 ^③ (AUC51%↓)				添付文書・IF 前後6時間は投与しない
	スタリビルド配合錠	エムトリシタビン エルビテグラビル コピシスタット テノホビルジソプロキシルフマル酸塩	吸収低下 ^④ (AUC20%↓)				添付文書・IF 2時間以上あけて投与すること
	テビケイ錠50mg	ドルテグラビルナトリウム	吸収低下 ^④ (Cmax72%↓)		吸収低下 ^④ (Cmax35%↓)		添付文書・IF
	トリーメク配合錠	アバカビル硫酸塩 ドルテグラビルナトリウム ラミブジン	吸収低下 ^④ (Cmax72%↓)		吸収低下 ^④ (Cmax35%↓)		金属含有製剤の投与2時間前または6時間後に投与
	コムブレラ配合錠	リルビリン塩酸塩 テノホビルジソプロキシルフマル酸塩 エムトリシタビン	吸収低下 ^⑥				投与の2時間前以上前又は4時間以上後に投与
	ゲンボイヤ配合錠	エルビテグラビル コピシスタット エムトリシタビン テノホビル アラフェナミドフマル酸塩	吸収低下 ^④				添付文書・IF 2時間以上間隔をあけて投与
その他	メタルカプターゼカプセル	ベニシラミン	効果減弱 ^⑥				添付文書・IF 同時投与は避ける
	メタライトカプセル	塩酸トリエンチン			効果減弱 ^③		添付文書・IF 2時間以上の間隔をあける
	レボレード錠12.5mg	エルトロンボバゴラミン	吸収阻害 ^④ (AUC70%↓)		吸収阻害 ^④		添付文書・IF 本剤投与前4時間、投与後2時間以上あける
	エクジェイド懸濁用錠125mg	デフェラシロクス	効果減弱 ^③				

【機序】

①陽イオンと交換する可能性 ②消化管内で結合、吸着 ③キレート形成④錯体形成 ⑤機序不明 ⑥その他

参考:各種添付文書、インタビューフォーム