

# 当院採用の抗アレルギー薬(外用)

分類	採用	採用薬品名	製剤写真	一般名	効能効果			用法	自動車 運転等	
					気管支喘 息	アレル ギー性鼻 炎	アレル ギー性結 膜炎			
ケミカル メディエーター 遊離阻害	院内外	インタール吸入液1%		クロモグリク酸 ナトリウム	○			朝、昼及び就寝前ないしは朝、昼、夕及び就寝前1回1アンプルずつ、1日3～4アンプルを電動式ネブライザーを用いて吸入。症状の緩解が得られれば、その後の経過を観察しながら1日2～3アンプルに減量。	なし	
	院外	インタールエアロゾル1mg			○			1回2噴霧、1日4回吸入する、症状の緩解が得られれば、その後の経過を観察しながら1日2～3回に減量。		
	院外	インタール点眼液2%					○※1	1回1～2滴を1日4回点眼。		
	院外	インタール点眼液UD2%					○※1			
	院内外	インタール点鼻液2%					○	1日6回、1回各鼻腔に1噴霧ずつ噴霧吸入。症状の緩解が得られれば、その後の経過を観察しながら減量。		
	院外	ケタス点眼液0.01%		イブジラスト			○※2	1回1～2滴を1日4回点眼。		なし
	院外	ゼペリン点眼液0.1%		アシタザノラスト			○	1回1～2滴を1日4回点眼。		なし
	院外	トラメラス点眼液0.5%		トラニラスト			○	1回1～2滴を1日4回点眼。		なし

※1: 春季カタル含む ※2: 花粉症含む

# 当院採用の抗アレルギー薬(外用)

分類	採用	採用薬品名	製剤写真	一般名	効能効果			用法	自動車運転等
					気管支喘息	アレルギー性鼻炎	アレルギー性結膜炎		
第二世代 抗ヒスタミン薬	院内外	アレジオン点眼液0.05%		エピナスチン塩酸塩			○	1回1滴、1日4回点眼	なし
	院内外	ザジテン点眼液0.05%		ケトチフェン フマル酸塩			○	1回1～2滴を1日4回点眼。	なし
	院内外	ザジテン点鼻液0.05%					○	1日4回、1回各鼻腔に1噴霧ずつ、本剤専用の鼻用定量噴霧器を用いて噴霧吸入。	避ける
	院外	リボスチン点鼻液 0.025mg/112噴霧用		レボカバステチン塩酸塩			○	1日4回、1回各鼻腔に2噴霧ずつ噴霧吸入。	避ける
	院内外	リボスチン点眼液0.025%					○	1回1～2滴を1日4回点眼。	なし
	院内外	パタノール点眼液0.1%		オロパタジン塩酸塩			○	1回1～2滴を1日4回点眼。	なし
その他	院外	AZ点眼液0.02%		アズレンスルホン酸 ナトリウム水和物			○※3	1日3～5回、1回1～2滴を点眼。	なし
	院内外	パピロックミニ点眼液0.1%		シクロスポリン			※4	1回1滴、1日3回点眼。	なし
	院内外	タリムス点眼液0.1%		タクロリムス水和物			※4	用時よく振り混ぜたのち、1回1滴を1日2回点眼。	なし

※3: 急性結膜炎、慢性結膜炎、表層角膜炎、眼瞼縁炎、強膜炎含む ※4: 春季カタル(抗アレルギー剤が効果不十分な場合)のみ