

DI ニュース 2019年10月1号

ラミクタール錠の処方にあたって

ラミクタールは併用している薬剤に応じて投与スケジュールが決まっています。

併用薬に応じた用法用量の設定が必要です。

2 ページ以降の「ラミクタール錠処方にあたって」(てんかん 成人用)(双極性障害 成人用)(グラクソスミスクライン提供資料)を参考に投与スケジュールを確認してください。

ラミクタール錠は、内服に伴う重篤な皮膚障害が発現し死亡に至った例も報告されており、

2015年2月に安全性速報(ブルーレター)も発出され下記2点について注意喚起がされています。

- ・用法用量の遵守
- ・皮膚障害の早期発見、早期治療に努めること

発疹に加え、右のような症状があらわれた場合には、重篤な皮膚障害に至ることがあるので直ちに本剤の投与を中止してください。

注意すべき初期症状

発熱(38℃以上)
眼充血
口唇・口腔粘膜のびらん
咽頭痛
全身倦怠感
リンパ節腫脹 等

代表的なラミクタールと併用される当院採用薬


| 一般名(五十音順) | 当院採用薬 | | | | |
|----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| アリピプラゾール | エビリファイ錠3mg、6mg、12mg | エビリファイOD錠24mg | エビリファイ内用液0.1% | エビリファイ持続性水懸筋注用シリンジ300mg、400mg | |
| オランザピン | オランザピンOD錠2.5mg、5mg「明治」 | オランザピンOD錠10mg「DSEP」 | オランザピン細粒1%「ヨシトミ」 | ジブレキサ筋注用11mg | |
| ガバペンチン | ガバペン錠200mg、300mg | レグナイト錠300mg | | | |
| カルバマゼピン | テグレート錠100mg、200mg | テグレート細粒50% | | | |
| シメチジン | シメチジン錠200mg「日医工」 | | | | |
| ゾニサミド | エクセグラン錠100mg | エクセグラン散20% | トレリーFOD錠25mg、50mg | | |
| トピラマート | トピナ錠50mg、100mg | トピナ細粒10% | | | |
| バルプロ酸Na | セレニカR錠400mg | デパケンR錠100mg、200mg | デパケン錠200mg | デパケン細粒40% | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」 |
| フェニトイン | アレビアチン錠100mg | ヒダントール錠25mg | アレビアチン散10% | アレビアチン注250mg | ホストイン静注750mg |
| フェノバルビタール | フェノバル散10% | フェノバルエリキシル0.4% | ルビアール坐剤51 | フェノバル注射液100mg | ノーバルバル静注用250mg |
| プリミドン | プリミドン細粒99.5%「日医工」 | | | | |
| プレガバリン | リリカOD錠25mg、75mg、150mg | | | | |
| ペランパネル | フィコンバ錠2mg、4mg | | | | |
| ラコサミド | ビムバット錠50mg、100mg | | | | |
| リチウム | 炭酸リチウム錠100、200「ヨシトミ」 | | | | |
| リファンプシシ | リファジンカプセル150mg | | | | |
| レベチラセタム | イーケブラ錠250mg、500mg | イーケブラドライシロップ50% | イーケブラ点滴静注500mg | | |
| ロピナビル・リトナビル配合剤 | カレトラ配合錠 | | | | |

下記事項を確認し、処方・調剤をお願いします。

POINT 併用している薬剤に応じて投与スケジュールが決まっています

■ バルプロ酸ナトリウムとの併用療法もしくは併用
 ■ ラミクタールの代謝への影響が不明な薬剤との併用療法
 主な薬剤（一般名）
 ・カルバマゼピン/フェニトイン/フェノバルビタール/プリミドン/ゾニサミド/ガバペンチン/トピラマート/レベチラセタム以外のてんかんの治療に用いる薬剤


▶ Yes



▼ No

■ ラミクタールの代謝を促進する薬剤との併用療法もしくは併用
 (バルプロ酸ナトリウム非併用)
 主な薬剤（一般名）
 ・カルバマゼピン
 ・フェニトイン
 ・フェノバルビタール
 ・プリミドン
 ・リファンピシン
 ・ロピナビル・リトナビル配合剤

▶ Yes




▼ No

■ ラミクタール単剤療法もしくは
 ラミクタールの代謝に影響を及ぼさない薬剤との併用療法もしくは併用
 (バルプロ酸ナトリウム非併用)
 主な薬剤（一般名）
 ・ゾニサミド
 ・シメチジン
 ・ガバペンチン
 ・リチウム
 ・トピラマート
 ・オランザピン
 ・レベチラセタム
 ・アリピプラゾール
 ・プレガバリン
 ・ペランパネル
 ・ラコサミド

▶ Yes



ラミクタール®錠 添付文書2017年3月改訂(第11版)



ラミクタール®錠 添付文書2017年3月改訂(第11版)

下記事項を確認し、処方・調剤をお願いします。

POINT 併用している薬剤に応じて投与スケジュールが決まっています

漸増期 維持期 (*維持用量)

1週、2週 3週、4週 5週 6週 7週目以降

■ バルプロ酸ナトリウムとの併用療法もしくは併用

■ ラミクタールの代謝への影響が不明な薬剤との併用療法
主な薬剤 (一般名)

- リチウム/オランザピン/アリピプラゾール/カルバマゼピン以外の双極性障害の治療に用いる薬剤

▶ Yes

| | | | | |
|----------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 1週、2週 | 3週、4週 | 5週 | 6週 | 7週目以降 |
| 1回25mg 隔日 (2日に1回) | 25mg/日 (1日1回) | 50mg/日 (1日1回or 2回に分割) | 100* mg/日 (1日1回or 2回に分割) | 増量は 1週間以上の間隔 をあけて 最大50mg ずつ 最大200mg/日 まで (1日1回or2回に分割) |

▼ No

■ ラミクタールの代謝を促進する薬剤との併用療法もしくは併用
(バルプロ酸ナトリウム非併用)

主な薬剤 (一般名)

- カルバマゼピン
- フェニトイン
- フェノバルビタール
- プリミドン
- リファンピシン
- ロピナビル・リトナビル配合剤

▶ Yes

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 50mg/日 (1日1回) | 100mg/日 (1日2回に分割) | 200mg/日 (1日2回に分割) | 300mg/日 (1日2回に分割) | 300*~400* mg/日 (1日2回に分割) |
| 増量は 1週間以上の間隔 をあけて 最大100mg ずつ 最大400mg/日 まで (1日2回に分割) | | | | |

▼ No

■ ラミクタール単剤療法もしくは
ラミクタールの代謝に影響を及ぼさない薬剤との併用療法もしくは併用
(バルプロ酸ナトリウム非併用)

主な薬剤 (一般名)


- リチウム
- オランザピン
- アリピプラゾール
- ゾニサミド
- ガバペンチン
- トピラマート
- レベチラセタム
- プレガバリン
- シメチジン
- ペランパネル
- ラコサミド

▶ Yes

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| 25mg/日 (1日1回) | 50mg/日 (1日1回or 2回に分割) | 100mg/日 (1日1回or 2回に分割) | 200* mg/日 (1日1回or 2回に分割) | 増量は 1週間以上の間隔 をあけて 最大100mg ずつ 最大400mg/日 まで (1日1回or2回に分割) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|

ラミクタール®錠 添付文書2017年3月改訂(第11版)

患者さんそれぞれにあった治療のためのラミクタール3STEP投与



ラミクタール®錠 添付文書2017年3月改訂(第11版)