

アジマイシン点眼液1%適正使用のお願い

15員環マクロライド系抗生物質点眼剤

アジマイシン点眼液1% 眼科限定

[用法・用量]

〈結膜炎〉

通常、成人及び7歳以上の小児には、

1回1滴、1日2回2日間、その後、1日1回5日間点眼する。

〈眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎〉

通常、成人には、1回1滴、1日2回2日間、その後、1日1回12日間点眼する。



注意 用法(点眼日数)が疾患によって異なります。

7日間 結膜炎

1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
1日2回	1日2回	1日1回				

14日間 眼瞼炎、麦粒腫、涙嚢炎

1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目
1日2回	1日2回	1日1回											

注意 1日の点眼回数が3日目から変わります。
初日、2日目は1日2回点眼、3日目以降は1日1回点眼

< 用法 >		
(点眼薬) 1日2回		
右眼点眼 1日2回2日間、その後1日1回12日間		
薬品名	単位	
アジマイシン点眼液1% (2.5mL (全))	本	1

点眼する際は、薬袋のコメントに記載されている用法をよくご確認ください。

その他の注意

- ✓ キャップをしたまま点眼容器を下に向け、数回振ってからキャップを開けて点眼してください。
- ✓ 開栓前は冷蔵庫(2~8℃)で保管し、開栓後は室温(1~30℃)で保管してください。