

トルツ皮下注80mg適正使用のお願い

ヒト化抗ヒトIL-17Aモノクローナル抗体製剤
トルツ皮下注80mgオートインジェクター



注意 用法用量(投与間隔)が疾患によって異なります。

尋常性乾癬、関節症性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症
(既存治療で効果不十分な場合)

通常、成人にはイキセキズマブ(遺伝子組換え)として初回に160mgを皮下投与し、2週間から12週間までは1回80mgを2週間隔で皮下投与し、以降は1回80mgを4週間隔で皮下投与する。
※12週時点で効果不十分な場合には、1回80mgを2週間隔で皮下投与できる。



NEW 強直性脊椎炎(既存治療で効果不十分な場合)

通常、成人にはイキセキズマブ(遺伝子組換え)として1回80mgを4週間隔で皮下投与する。



守っていただくこと

本剤は外箱に入れたまま、冷蔵庫(2~8℃)に遮光保存してください。やむを得ず冷蔵保存できない場合は、室温(30℃以下)で遮光保存し、5日以内にご使用ください。

本剤を冷蔵庫から取り出し、ご使用になる前に30分間、室温に置いておくことが望ましいです。

してはいけないこと

本剤を凍結させないでください。もし凍結させてしまった場合は、使用しないでください。

本剤を電子レンジで温めたり、お湯をかけたり、直射日光の当たるところに放置しないでください。

本剤を激しく振らないでください。

参考資料: 医薬品添付文書、トルツ皮下注取扱説明書