

胃酸分泌抑制薬一覽

★詳細は最新の添付文書でご確認ください

【内服】

一般名	商品名	製剤写真の例	採用	主な効能・効果							
				胃潰瘍、 十二指腸潰瘍、 吻合部潰瘍、 逆流性食道炎、 ソリンジャー・エリ ソン症候群	上部 消化管 出血	下記における ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助	非びらん 性胃食道 逆流症	低用量アスピリン 投与時の胃潰瘍 又は十二指腸潰 瘍の再発抑制	NSAIDs投与時 の胃潰瘍又は十 二指腸潰瘍の再 発抑制	急性・慢性胃炎急 性増悪期の胃粘 膜病変改善	麻酔 前投薬
オメプラゾール	オメプラゾール錠 オメプラゾール腸溶錠		なし	○	—	○	10mg錠のみ○	—	—	—	—
	オメプラール錠		なし	○	—	○	10mg錠のみ○	—	—	—	—
	オメプラゾン錠		なし	○	—	○	10mg錠のみ○	—	—	—	—
ランソプラゾール	ランソプラゾールOD錠 ランソプラゾールカプセル		院内外	○	—	○	15mg錠のみ○	—	—	—	—
	タケブロンOD錠 タケブロンカプセル		なし	○	—	○	15mg錠のみ○	—	—	—	—
	タビゾールカプセル		なし	○	—	○	15mgcpのみ○	—	—	—	—
	タケルダ配合錠	配合錠 	院外	下記疾患又は術後における血栓・塞栓形成の抑制(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある患者に限る) ・狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞) ・冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後							
PPI	ラベプラゾールナトリウム錠		院内外	○	—	○	5mg・10mg錠のみ○	5mg錠のみ○	—	—	—
	バリエット錠		院内外	○	—	○	5mg・10mg錠のみ○	—	—	—	—
	ラベキア	バック 	院外	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、 胃MALTリンパ腫、 特発性血小板減少性紫斑病、 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症							
	ラベファイ	バック 	院外	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎							
エソメプラゾール	ネキシウムカプセル ネキシウム懸濁用顆粒		院内外	○	—	○	10mgのみ○	○	○	—	—
ボノプラザン	タケキャブ錠		院内外	○	—	○	—	○	○	—	—
	ボノサブ	バック 	院外	胃潰瘍、十二指腸潰瘍、 胃MALTリンパ腫、 特発性血小板減少性紫斑病、 早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクター・ピロリ感染症							
	ボノピオン	バック 	院外	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎							
	キャブピリン	配合錠 発売予定 	—	下記疾患又は術後における血栓・塞栓形成の抑制(胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある患者に限る) ・狭心症(慢性安定狭心症、不安定狭心症)、心筋梗塞、虚血性脳血管障害(一過性脳虚血発作(TIA)、脳梗塞) ・冠動脈バイパス術(CABG)あるいは経皮経管冠動脈形成術(PTCA)施行後							
H ₂ ブロッカー	ファモチジン錠 ファモチジンD錠(OD錠) ファモチジン散(細粒)		院内外	○	○	—	—	—	—	○	—
	ガスター錠 ガスターD錠 ガスター散		院外	○	○	—	—	—	—	○	—
	チオスター錠		なし	○	○	—	—	—	—	○	—
	プロスターM錠		なし	○	○	—	—	—	—	○	—
	シメチジン錠		院内外	○	○	—	—	—	—	○	—
	タガメット錠 タガメット細粒		なし	○	○	—	—	—	—	○	—
	カイロック細粒		なし	○	○	—	—	—	—	○	—
	ロキササジン ロキササジン酢酸エステル塩酸 塩徐放カプセル		なし	○	—	—	—	—	—	○	○
	アルタットカプセル アルタット細粒		院外	○	—	—	—	—	—	○	○
	ニザチジン錠 ニザチジンカプセル		なし	胃潰瘍、 十二指腸潰瘍、 逆流性食道炎、 のみ○	—	—	—	—	—	75mg錠のみ○	—
ラフチジン	アシノン錠		院外	—	—	—	—	—	—	—	—
	ラフチジン錠 プロテカジン錠 プロテカジンOD錠		院内外 なし	胃潰瘍、 十二指腸潰瘍、 吻合部潰瘍、 逆流性食道炎、 のみ○	—	—	—	—	—	○	○

【当院採用の注射薬】

★詳細は最新の添付文書でご確認ください

	一般名	商品名	製剤写真	主な効能・効果			
				経口投与不可な 出血を伴う胃潰瘍、 十二指腸潰瘍、 急性ストレス潰瘍及び急性胃粘膜病変	(経口投与不可な) ゾリンジャー-エリソン症候群	上部消化管出血、 侵襲ストレスによる上部消化管出血	麻酔前投薬
PPI	オメプラゾール	オメプラゾール注射用20mg「日医工」		○	○	—	—
	ランソプラゾール	タケプロン静注用30mg		○	—	—	—
H ₂ ブ ロ ツ カ ー	ファモチジン	ファモチジン注射用20mg「サワイ」		—	○	○	○
	ロキサチジン	アルタット静注用75mg		—	—	上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)	○