

令和2年10月28日

保険薬局薬剤師 殿

愛媛大学医学部附属病院薬剤部
薬剤部長 田中 守

院外処方箋様式の1回量処方(1日量併記)への変更について

平素は、当院の薬剤業務に対するご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

今回、当院の病院情報システム更新に合わせて、11月4日(水)より院外処方箋の様式を厚生労働省の報告書*に準じた様式に変更致します。

※ 平成22年1月厚生労働省から「内服薬処方箋の記載方法の在り方に関する検討会」の報告が発出

主な変更点は、以下となります。別紙の記載例で詳細をご確認ください。

【基本】

- 処方箋の用量記載を1回量と1日量の併記に変更
(記載例:1回1錠(1日3錠))
※ なお、文字数が多くなると改行して表示されます。
※ 用法は、従来通り 分2, 分3と表示されます。今後、1日2回, 1日3回の表示に変更する予定としております。

【例外】

- 不均等処方の場合は、1回量が表示されず「不均等」と印字されます(例③)。
- 処方オーダー時に1回量または1日量の入力を選択できるため、例⑦のように1日量の表示が異なるケースがあります。調剤方法についてもあわせてご確認ください。

なお、病院情報システム更新直後は処方オーダーの不具合が発生することが危惧されます。

保険薬局にて不具合の事例を発見された際は下記連絡先にご連絡をお願い致します。

保険薬局各位のご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

【別紙】

- ◆ 記載例
- ◆ 変更後の処方箋見本

連絡先

愛媛大学医学部附属病院 薬剤部

電話 089-960-5738 (調剤室、薬剤師外来)

電話 089-960-5732 (薬品情報管理室) 平日 8:30~17:15

【変更点と記載例】

① 内服の用量を「1日量」から「1回量」に変更

例)【般】【肝腎】ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 1回1錠(1日3錠)
分3 (朝、昼、夕)食後 7日分

② 頓服の内服の表示

例)【般】【肝腎】ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg 1回1錠
頓用:5回分, 疼痛時に 頓用

③ 不均等の場合、「不均等(1日量)」と記載され、下段に服用タイミングごとの服用量を記載

例)メネシット配合錠 不均等(1日6錠)
分4 起床, (朝、昼、夕)食後 7日分
不均等(2錠/2錠/1錠/1錠)

④ 散薬の用量を「1日量」から「1回量」、【製剤量】か【成分量】を明記

例)【般】クエチアピン細粒 50% 1回6.25mg(1日6.25mg) (成分量)
分1 (朝)食後 7日分
例)【般】クエチアピン細粒 50% 1回0.012g(1日0.012g) (製剤量)
分1 (朝)食後 7日分

⑤ 全量処方薬の薬剤(外用薬、注射薬など)は、「(全量)●本」と表記

例)ロキソプロフェン Na ゲル 1%(25g/本)(全) (全量)2本
(ぬり薬) 1日2回
首, 肩, 塗布

⑥ 内服同様のオーダとなる外用薬(薬品名のあとに①と表示されている)

<1回量(1日量併記)で日数処方>

例)【般】ジフルコルトロン・リトカイン配合軟膏(2g/本)① 1回1本(1日2本)
(痔用軟膏)1日2回 7日分
肛門内, 朝と眠前 肛門塗布

<頓用処方:○回分>

例)【般】ジフルコルトロン・リトカイン配合軟膏(2g/本)① 1回1本
(痔用軟膏) 5回分, 痛いとき 肛門内塗布

⑦ 錠剤粉碎時における非整数処方のケースと調剤方法について

【医師が1回量でオーダした場合】

例) (粉)【般】【腎】エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 1回0.33錠(1日0.99錠)
分3 (朝、昼、夕)食後 7日分

※**粉碎錠数計算の際、2%までの範囲で計算時の誤差を許容する。**

(調剤)⇒エナラプリル 2.5mg 計算上 6.93錠÷7錠粉碎調剤

【医師が1日量でオーダした場合】

例) (粉)【般】【腎】エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg 1回0.333錠(1日1錠)
分3 (朝、昼、夕)食後 7日分

(調剤)⇒エナラプリル 2.5mg 7錠を粉碎調剤

⑧ 水剤の表示

例)フスコデ配合シロップ 1回3.333ml(1日10ml)
分3 (朝、昼、夕)食後 5日分