

アセリオ静注液1000mgバッグ 適正使用のお願い



1

成人は用途によって投与量が異なります

	用量	投与時間	投与間隔	最大投与量 (1日総量)
成人における 疼痛	1回300mg~1000mg ※体重50kg未満の場合 1回15mg/kgを上限	15分	4~6時間以上	4000mg/日まで ※体重50kg未満の場合 60mg/kg/日まで
成人における 発熱	1回300mg~500mg	15分	4~6時間以上 ※1日2回まで	1500mg/日まで

2

乳幼児、小児は年齢によって投与量が異なります

	疼痛及び発熱時 の用量	投与時間	投与間隔	最大投与量 (1日総量)
2歳未満 の幼児 及び乳児	1回7.5mg/kg ※1回500mgを上限	15分	4~6時間以上	30mg/kg/日まで ※1500mg/日を上限
2歳以上 の幼児 及び小児	1回10~15mg/kg ※1回500mgを上限	15分	4~6時間以上	60mg/kg/日まで日 ※1500mg/日を上限

※低出生体重児、新生児及び3カ月未満の乳児への投与は、使用経験が少なく、安全性は確立していない（添付文書より抜粋）

3

その他の使用上の注意点

アセリオ静注液1000mgバッグの投与は、経口製剤及び坐剤の投与が困難で、静注剤による緊急の治療が必要である場合などに考慮し、経口製剤または坐剤の投与が可能になれば速やかに経口製剤または坐剤の投与への切り替えをご検討ください。