

経口血糖降下薬一覧

■は当院採用薬（一般名が■の場合は後発品採用）

※用法・用量等、詳細は最新の添付文書でご確認ください。

分類	一般名	代表的な商品名	当院の 術前休業の 目安	後発品	先発品の製剤写真の例 ※後発品またはその他	用法	単剤での 低血糖 リスク
S G L T 2 阻 害 薬	ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物	フォシーガ	3日	無		1日1回	
	イプラグリフロジン L-プロリン	スーグラ		無		1日1回朝食前または朝食後	
	エンバグリフロジン	ジャディアンス		無			
	カナグリフロジン水和物	カナグル		無			
	トホグリフロジン水和物	アプルウェイ		無			
	ルセオグリフロジン水和物	ルセフィ		無			
				無			
イン ス リ ン 分 泌 非 促 進 系	ブホルミン塩酸塩	ジベトス	2日	有		1日2~3回食後	低
		ジベトンS		有			
	メトホルミン塩酸塩	グリコラン		有			
		メトグルコ		有		1日2~3回食直前または食後	
	チ ア ン ゾ リ ジ	ピオグリタゾン塩酸塩		アクトス	前日 〜 当日	有	
α ー グ ル コ シ ダ ー ゼ 阻 害 薬	アカルボース	グルコバイ	前日 〜 当日	有		1日3回食直前	
	ボグリボース	ベイスン		有			
	ミグリトール	セイブル		有			

■は当院採用薬（一般名が■の場合は後発品採用）
















※用法・用量等、詳細は最新の添付文書でご確認ください。

分類	一般名	代表的な商品名	当院の 術前休業の 目安	後発品	先発品の製剤写真の例	用法	薬剤での 低血糖 リスク	
D P P - 4 阻 害 薬	アログリプチン安息香酸塩	ネシーナ	前 日 ～ 当 日	無		1日1回	低	
	サキサグリプチン水和物	オングリザ		無				
	シタグリプチンリン酸塩水和物	グラクティブ		無				
		ジャヌビア		無				
	テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物	テネリア		無				
	リナグリプチン	トラゼンタ		無				
	アナグリプチン	スイニー		無				1日2回（朝夕）
	ビルダグリプチン	エクア		無				
	オマリグリプチン	マリゼブ		無				週1回
	トレラグリプチンコハク酸塩	ザファテック		無				
GLP-1受容体作動薬	セマグルチド	リベルサス	無		1日1回（起床時）			
速 効 型 イ ン ス リ ン 促 進 薬	ナテグリニド	スターシス	前 日 ～ 当 日	有		1日3回食直前	中	
		ファスティック		有				
	ミチグリニドカルシウム水和物	グルファスト		有				
	レバグリニド	シュアポスト		有				
ス ル ホ ニ ル 尿 素 薬	クロルプロバミド	クロルプロバミド	前 日 ～ 当 日	無		1日1回朝食前または朝食後	高	
	アセトヘキサミド	ジメリン		無				
	グリクロピラミド	デアメリンS		無				
	グリクラジド	グリミクロン		有		1日1～2回（朝夕）食前または食後		
	グリベンクラミド	オイグルコン		有				
		ダオニール		有				
グリメピリド	アマリール	有						

経口血糖降下薬一覧（配合薬）

■は当院採用薬

※用法・用量等、詳細は最新の添付文書でご確認ください。

分類	成分名	商品名	1錠中の成分量	当院の 術前休薬の 目安	製剤写真
SGLT2阻害薬 + DPP-4阻害薬	カナグリフロジン水和物 +テネリグリブチン臭化水素酸塩 水和物	カナリア配合錠	カナグリフロジン100mg +テネリグリブチン20mg	3日	
	イブラグリフロジン L-プロリン +シタグリブチンリン酸塩水和物	スージャヌ配合錠	イブラグリフロジン50mg +シタグリブチン50mg		
	エンバグリフロジン +リナグリブチン	トラディアンス配合錠	AP エンバグリフロジン10mg +リナグリブチン5mg		
BP エンバグリフロジン25mg +リナグリブチン5mg					
ビッグアナイド薬 + DPP-4阻害薬	メトホルミン塩酸塩 +アログリブチン安息香酸塩	イニシク配合錠	メトホルミン塩酸塩500mg +アログリブチン25mg	2日	
	メトホルミン塩酸塩 +ビルダグリブチン	エクメット配合錠	LD メトホルミン塩酸塩250mg +ビルダグリブチン50mg		
	メトホルミン塩酸塩 +アナグリブチン		HD メトホルミン塩酸塩500mg +ビルダグリブチン50mg		
ビッグアナイド薬 + チアゾリジン薬	メトホルミン塩酸塩 +ピオグリタゾン塩酸塩	メタクト配合錠	LD メトホルミン塩酸塩250mg +アナグリブチン100mg	2日	
			HD メトホルミン塩酸塩500mg +アナグリブチン100mg		
速効型インスリン分泌促進薬 + α-グルコシダーゼ阻害薬	ミチグリニドカルシウム水和物 +ボグリボース	グルベス配合	錠 ミチグリニドカルシウム 水和物10mg +ボグリボース0.2mg	前日～当日	
			OD錠		
チアゾリジン薬 + DPP-4阻害薬	ピオグリタゾン塩酸塩 +アログリブチン安息香酸塩	リオベル配合錠	LD ピオグリタゾン15mg +アログリブチン25mg	前日～当日	
			HD ピオグリタゾン30mg +アログリブチン25mg		
スルホニル尿素薬 + チアゾリジン薬	グリメピリド +ピオグリタゾン塩酸塩	ソニアス配合錠	LD グリメピリド1mg +ピオグリタゾン15mg	前日～当日	
			HD グリメピリド3mg +ピオグリタゾン30mg		

参考文献：糖尿病治療ガイド2020-2021、糖尿病専門医研修ガイドブック第8版、各添付文書