

20%マンニトール注射液「YD」から マンニトールS注射液への採用変更について

結晶析出の問題を軽減する目的で、20%マンニトール注射液「YD」からマンニトールS注射液へ採用を変更いたします。

マンニトールS注射液には、結晶析出防止のためD-ソルビトールが含まれます。



旧 20%マンニトール注射液「YD」

〈組成〉

1袋300mL中に

D-マンニトール 60g を含有する



NEW

マンニトールS注射液

〈組成〉

1袋300mL中に

D-マンニトール 45g

D-ソルビトール 15g を含有する

D-ソルビトールが含まれるため、マンニトールSは
遺伝性果糖不耐症の患者に**投与禁忌**です!!

〈マンニトールS注射液について〉

適応：●脳圧降下及び脳容積の縮小を必要とする場合。

●眼内圧降下を必要とする場合。

●術中・術後・外傷後及び薬物中毒時の急性腎不全を浸透圧利尿により予防及び治療する場合。

用法：通常、**体重1kgあたり7～20mL**を点滴静注する。投与速度は、3～10分間に100mLとする。なお、年齢、症状により適宜増減する。

ただし、1日量は、D-マンニトールとして200gまでとする。

禁忌：●**遺伝性果糖不耐症の患者**

●**低張性脱水症の患者**

●**急性頭蓋内血腫のある患者**

その他、詳細については添付文書をご参照ください