

食物アレルギー患者に注意が必要な当院採用薬一覧

■卵アレルギー

区分	アレルギー対象患者	商品名	一般名	備考
禁忌	鳥類のたんぱく質、羽毛、卵	サイビスクedisポ関節注	ヒアルロン酸ナトリウム	ニワトリのトサカから抽出されたヒアルロン酸ナトリウムを使用しているため
原則禁忌	卵、卵製品	ソナゾイド注射用	ペルフルブタン	鶏卵由来の安定剤(水素添加卵黄ホスファチジルセリンナトリウム)を用いているため
注意※1	鶏卵、鶏肉、その他鶏由来のもの	インフルエンザ HA ワクチン「生研」	インフルエンザ HA ワクチン	インフルエンザウイルスの A 型及び B 型株をそれぞれ個別に発育鶏卵で培養を行っているため

その他※2 卵に由来する成分を含有する薬剤

★卵黄レシチン: イントラリボス、エネフリード輸液、ディプリバン注、プロポフォル注、リプルキット注、リメタゾン注、ロピオン注

★製造工程において鶏卵成分使用: アンサー皮下注、スミフェロン注 DS、ノイトロピン注、ラビピュール筋注用

■牛乳アレルギー

区分	アレルギー対象患者	商品名	一般名(薬効分類)	備考	
禁忌	牛乳(カゼイン)	アミルバン EN 配合散	(経腸栄養剤)	添加物としてカゼインを含有するため	
	牛乳(タンパク)	イノラス配合経腸用液		牛乳由来のタンパク質が含まれているため	
	牛乳(タンパク)	エネーボ配合経腸用液		牛乳由来のタンパク質が含まれているため	
	牛乳(カゼイン)	エンシュア・H		エンシュア・リキッド	牛乳由来のカゼインが含まれているため
		エンシュア・リキッド			
	牛乳	タンニン酸アルブミン「ニコー」	タンニン酸アルブミン		
牛乳(カゼイン)	ラコール NF 配合経腸用液	ラコール NF 配合経腸用半固形剤	(経腸栄養剤)	牛乳由来のカゼインが含まれているため	
	ラコール NF 配合経腸用半固形剤				
注意※1	乳製品	ソル・メドロール静注用 40mg (125mg、500mg、1000mg は除く)	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム	添加物として、牛の乳由来の乳糖水和物を使用しているため	
	乳製品	イナビル吸入粉末剤	ラニナミビル	夾雑物として乳蛋白を含む乳糖水和物を使用しているため	
	乳製品	リレンザ	ザナミビル	夾雑物として乳蛋白を含む乳糖水和物を使用しているため	

その他※2 牛乳に由来する成分を含有する薬剤

★夾雑物として乳蛋白を含む乳糖水和物: アズマネックスツイストヘラー、アドエアディスカス、アノーロエリプタ、エンクラッセエリプタ、オーキシスタービューヘイラー、シムピコートタービューヘイラー、スピリーバ吸入用カプセル、セレベントディスカス、テリルジーエリプタ、フルタイドディスカス、メプチンスイングヘラー、レルベアエリプタ

★ウシ乳由来乳糖: ウロナーゼ静注用、HCG モチダ筋注、HMG 筋注用「F」

★製造工程においてウシ乳由来成分使用: アクトヒブ、エンタイバイオ注、クアトロバック、ノイトロピン注、破傷風トキソイドキット、フォルリモン P 注、ペンリス
タ皮下注、ボトックス注、ラビピュール筋注用、リツキサン注

■ゼラチン

区分	アレルギー対象患者	商品名	一般名	備考
禁忌	ゼラチン	エスクレ坐剤	抱水クロラル	カプセルの主成分にゼラチン(ブタ皮由来)を使用しているため
注意※1	ゼラチン	ウロナーゼ静注用	ウロキナーゼ	賦形剤として精製ゼラチンを含んでいるため

その他※2 ゼラチンに由来する成分を含有する薬剤: アーガメイトゼリー、アデホスコーク顆粒、アミノレバン EN 配合散、インデラル錠、SP トローチ「明治」、エビリファイ OD 錠、経口用トロンピン細粒、クラリチンレディタブ錠、シクレスト舌下錠、シダキユアスギ花粉舌下錠、セlestamin 配合錠、セレナール錠、センソンド錠、タカベンス錠、調剤用パンピタン末、テノーミン錠、デノタスチュアブル錠、デパケン R 錠、トコフェノール酢酸エステル錠「トーフ」、ノボセブン HI 静注、バファリン配合錠 A81、パルタン M 錠、ピソルボン錠、ヒルナミン錠、ピレチア錠、フェロベリン配合錠、フラジール内服錠、プリモボラン錠、ブルフェン錠、マイテラーゼ錠、マクサルト RPD 錠、ミティキュアダニ舌下錠、ミニリンメルト OD 錠、ラビピュール筋注用、リタリン錠
(その他一般的なカプセル剤、パップ剤は製剤多数のため薬剤名省略)

■大豆アレルギー

区分	アレルギー対象患者	商品名	一般名	備考
注意※1	大豆	アムピゾーム点滴静注用	アムホテリシンB	添加物に大豆由来の成分(大豆リン脂質)が含まれるため
	大豆	ドキシル注	ドキシソルピシン塩酸塩	添加物に大豆由来の成分(大豆ホスファチジルコリン)が含まれているため

その他※2 大豆に由来する成分(大豆油、大豆レシチン、大豆リン脂質、分離大豆タンパク質、大豆多糖類)を含有する薬剤: イントラリポス、EPL カプセル、ヴェオリブリス錠、ウトロゲスタン腫瘍カプセル、エネフリード輸液、エネーボ配合経腸用液、エレンタール配合内容剤、エレンタール P 乳児用、エンシュア・H、エンシュア・リキッド、オフエブカプセル、オプスミット錠、オルミエント錠、キョーリン AP2 配合顆粒、ケイツーN 静注、シーエルセントリ錠、新レシカルボン坐剤、スチパーガ錠、セルセプト懸濁用散、タルグレンカプセル、ディプリバン注、トビエース錠、ナトリックス錠(1mg)、ベサノイドカプセル、プロボフォール注、メーゼント錠、ユーパスタコーワ軟膏、ラコール NF 配合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用半固形剤、ラベファインパック、リブルキット注、リメタゾン注、ロトリガ粒状カプセル、ロピオン注

■小麦アレルギー

禁忌・慎重投与なし

その他※2 小麦に由来する成分を含有する薬剤

★コムギデンプン: アモバン錠、ケフラル細粒、フラジール錠、フラジール内服錠、ポノピオンパック、ラベファインパック

★小麦(シヨウバク): 甘麦大棗湯

■ピーナッツアレルギー

禁忌・慎重投与なし

その他※2 落花生に由来する成分を含有する薬剤

★ラッカセイ油: ウトロゲスタン腫瘍カプセル(2021年8月以降、ヒマワリ油へ変更予定)、エルネオパ、オーツカ MV、バル筋注

※1: 慎重投与、重要な基本的注意、または特定の背景を有する者

※2: 添加物や製造工程において該当成分由来の使用について添付文書に記載のある薬剤

添付文書上に明確な禁忌・慎重投与の記載はありません。状況に応じて判断して下さい。