

当院における「ハイリスク薬」について

当院では、「生命の危険を脅かす重篤な有害事象を引き起す可能性のある医薬品」を「ハイリスク薬」として定義しています。(具体的な薬剤一覧については、「[医薬品安全管理手順書\(緑色のファイル\)](#)」をご参照ください)

これらの医薬品を使用する際には、特に注意をお願い致します！

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. 中枢神経系作用薬の中で添付文書の副作用に呼吸抑制の記載のある医薬品 | 5. 抗悪性腫瘍剤(抗がん剤)注射薬 |
| 2. 抗不整脈薬、血管拡張薬の中で添付文書の副作用に心停止もしくは不整脈の記載のある医薬品とカテコラミン製剤 | 6. 糖尿病用薬 |
| 3. カリウム製剤 | 7. 抗血栓薬 |
| 4. 抗悪性腫瘍剤(抗がん剤)内服薬 | 8. 免疫抑制剤 |
| | 9. 麻薬 |
| | 10. 筋弛緩薬(注射薬のみ) |
| | 11. B型肝炎の再活性化に注意が必要な医薬品 |

※救急カートや病棟等の定数配置薬では、**ハイリスク薬**と記載して区別しています。

なお、処方・注射オーダーの画面で、ハイリスク薬は種類によって下記のように色分けされています。

RP01 (麻)オキシコドン徐放錠20mg「第一三共」 分2(朝,夕)食後 06-14から2日分	赤:麻薬 青:抗がん剤 紫:向精神薬 桃:その他のハイリスク薬
RP02 【肝腎】エスワンタイホウ配合OD錠T20 分2(朝,夕)食後 06-14から2日分	
RP03 プロチゾラムOD錠(0.25mg)「サワイ」 分1 眠前 06-14から2日分	
RP04 プレドニゾロン錠(5mg)武田 分1(朝)食後 06-14から2日分	

また、処方または注射の「種別」にも同じ色がつきます。

種別
入院臨時

同一処方内に複数のハイリスク薬が含まれている場合は、以下の順番で、優先順位が高い色が表示されるようになっています。

☆優先順位☆

麻薬、抗がん剤 > 向精神薬 > その他のハイリスク薬

※外来処方において麻薬と抗がん剤が同時に処方された場合のみ、**黄緑色**になります