

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

形成外科

レジメン名称 : DAC-tam療法

レジメン説明 : 悪性黒色腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)▲ダカルバジン(100mg)	220mg /m2		242mg /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲ニドラン(50mg)	60mg /m2		66mg /m2
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	25mg /m2		27.5mg /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	末梢点滴注射	アロシ点滴静注バック (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:DAC-tam療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 day4-6にコデカトン錠8mgを考慮 アプレピタトCap 125mg+80mg(2日分)	750 μ g 9.9mg		ホダ時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:DAC-tam療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6mg 50m l			ホダ時	ホダ時				
03	末梢点滴注射	(癌)▲ダカルバジン(100mg) 蒸留水注(20ml) 生食 (250ml) 療法名:DAC-tam療法 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 輸液バック、ルートも遮光すること 投与順序②	0mg 20m l 250m l		ホダ時	ホダ時	ホダ時				
04	末梢点滴注射	(癌)▲ニドラン(50mg) 生食 (100ml) 療法名:DAC-tam療法	0mg 100m l		ホダ時						

最大クール数：0クール

レジメン名称：DAC-tam療法

[illegible]

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

形成外科

レジメン名称 : DAC-tam療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		*点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③									
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:DAC-tam療法 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0mg 500ml		〆ダ`時	〆ダ`時	〆ダ`時				
06	静脈内注射	フセリド`注 20mg/2ml「武田テバ」 療法名:DAC-tam療法 静脈内注射: 投与順序⑤	20mg		〆ダ`時	〆ダ`時	〆ダ`時				
07	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:DAC-tam療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250ml		〆ダ`時						
08	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:DAC-tam療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml			〆ダ`時	〆ダ`時				

RP	オーダーコメント
01	投与順序①