

# 【金属含有薬剤と相互作用を起こすおそれのある当院採用の経口剤】



分類	薬品名	一般名	金属				備考					
			AI	Mg	Fe	Ca						
血清カリウム抑制剤	カリメート（散、経口液）	ポリスチレンスルホン酸カルシウム Ca経口ゼリー	効果減弱①		効果減弱①		添付文書・IF 併用により全身性アルカローシスなどの症状があらわれたとの報告					
	ポリスチレンスルホン酸カルシウム Ca経口ゼリー											
	ケイキサレートDS											
甲状腺ホルモン剤	チラーチンS（散、錠）	レボチロキシンナトリウム水和物	吸收阻害②	吸收阻害②			添付文書・IF 投与間隔はできるだけ開ける					
	25mcgチロナミン錠	リオチロニンナトリウム										
降圧薬	アルドメット錠	メチルドバ水和物			吸收阻害⑤							
ジギタリス製剤	ジゴシン（散、錠）	ジゴシン	吸收阻害 血中濃度低下②		効果増強⑥							
	ハーフジゴシン K Y錠0.125											
	メチルジゴシン錠	メチルジゴシン										
肝・胆・消化機能改善剤	ウルソ（錠、顆粒）	ウルソデオキシコール酸	吸收低下②									
抗アレルギー薬	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩 塩酸ブゾイドエフェドリン	吸收低下② (AUC 40%↓)				添付文書・IF 同時服用は避けること					
	フェキソフェナジン塩酸塩錠	フェキソフェナジン塩酸塩										
骨代謝改善薬	アクトネル錠	リセドロン酸ナトリウム	吸收低下④				添付文書・IF 本剤服用後30分経ってから服用					
	リカルポン錠	ミノドロン酸水和物										
	ダイドロネル錠	エチドロン酸二ナトリウム	吸收低下④				添付文書・IF 服用前後2時間はあけること					
	ポンビバ錠	イバンドロン酸ナトリウム水和物	吸收低下④				添付文書・IF 本剤服用後60分経ってから服用					
	ボナロン（錠、ゼリー）	アレンドロン酸ナトリウム水和物	吸收低下③	吸收低下③	吸收低下③	吸收低下③	添付文書・IF 本剤服用後30分経ってから服用					
ビタミンD製剤	アルファロール (カプセル、散、内用液)	アルファカルシドール										
	アルファカルシドール錠											
	エルデカルシトール カプセル	エルデカルシトール										
止瀉剤	タンニン酸アルブミン	タンニン酸アルブミン			効果減弱②	併用禁忌！						
緩下剤	酸化マグネシウム(細粒、錠)	酸化マグネシウム	Feの吸収・排泄に影響であることあり ②⑥		高Ca血症に注意⑥	高Ca血症に注意⑥	添付文書・IF Fe:投与間隔空けること					
	グーフィス錠	エロビキシバット	効果減弱⑥									
HMG-CoA還元酵素阻害剤	クレストールOD錠	ロスバスタチンカルシウム	吸收低下⑤ (AUC 54%↓)				添付文書・IF 本剤投与後2時間以上あけて投与					
鎮痛薬	セレコキシブ錠	セレコキシブ	効果減弱⑤									
腎性貧血治療薬	エベレンゾ錠	ロキサデュスタット	効果減弱⑤				添付文書・IF 1時間以上間隔をあける					
	バフセオ錠	バダデュスタット	吸收低下③				添付文書・IF 2時間以上間隔をあける					
	マスーレッド錠	モリデュスタット	吸收低下⑤				添付文書・IF 1時間以上間隔をあける					
抗てんかん薬	ガバペン錠	ガバベンチン	吸收低下⑤ (AUC 20%↓)				添付文書・IF AI、Mg含有剤から2時間以上空けて投与					

分類	薬品名	一般名	金属				備考			
			AI	Mg	Fe	Ca				
抗パーキンソン薬	イーシー・ドパール配合錠	ベンセラジド塩酸塩 レボドバ	吸收低下 <sup>③</sup>	吸收低下 <sup>③</sup>	吸收低下 <sup>③</sup>	吸收低下 <sup>③</sup>	添付文書・IF 2~3時間空けて服用			
	エンタカボン錠	エンタカボン								
	スタレボ配合錠	エンタカボン カルビドバ水和物 レボドバ								
	ドバコール配合錠 (メネシット配合錠)	カルビドバ水和物 レボドバ								
	デュオドーバ配合経腸液	レボドバ								
	ドプスOD錠	ドロキンドバ								
	ドバストンカプセル	レボドバ								
	オンジエンティス錠	オビカボン								
抗悪性腫瘍剤	スプリリセル錠	ダサチニブ水和物	吸收阻害 <sup>⑤</sup>		吸收低下 <sup>④</sup>			添付文書・IF 本剤投与前後2時間はあけること		
	エストラサイトカプセル	エストラムスチンリン酸エステルナト リウム水和物	吸收低下 <sup>④</sup>			吸收低下 <sup>④</sup>				
免疫抑制剤	セルセプト (カプセル、懸濁用散)	ミコフェノール酸モフェチル	吸收低下 <sup>⑤</sup> (AUC 17%↓)		吸收低下 <sup>④</sup>					
抗生素 ニューキノロン系 キノロン系	オゼックス細粒小児用	トスフロキサンントシリ 酸塩水和物	吸收低下 <sup>④</sup> (AUC 37%↓)	吸收低下 <sup>④</sup> (AUC 54%↓)	吸收低下 <sup>④</sup> (AUC 16%↓)	吸收低下 <sup>④</sup> (AUC 42%↓)	添付文書・IF 同時投与は避けるなど注意すること			
	クラビット細粒	レボフロキサン水和物	吸收低下 <sup>③</sup> (AUC 44%↓)	吸收低下 <sup>③</sup> (AUC 22%↓)	吸收低下 <sup>③</sup> (AUC 19%↓)	吸收低下 <sup>③</sup>	添付文書・IF 本剤投与後1~2時間はあけること			
	レボフロキサン(錠、OD錠)		吸收低下 <sup>③</sup>							
	アベロックス錠	モキシフロキサン塩酸塩	吸收低下 <sup>③</sup>							
	グレースピット錠	シタフロキサン水和物	吸收低下 <sup>③</sup> (AUC 75%↓)	吸收低下 <sup>③</sup> (AUC 51%↓)	吸收低下 <sup>③</sup> (AUC 56%↓)	吸收低下 <sup>③</sup> (AUC 28%↓)	添付文書・IF 本剤服用後2時間以上あけること			
	シプロキサン錠	シプロフロキサン塩酸塩水和物	吸收低下 <sup>③</sup>							
	小児用バクシダール錠	ノルフロキサン	吸收阻害 <sup>③</sup>							
	ジェニナック錠	メシリ酸ガレノキサン水和物	吸收阻害 <sup>③</sup>							
	ラスピック錠	ラスフロキサン塩酸塩	吸收阻害 <sup>③</sup>				添付文書・IF 同時服用は避けること			
テトラサイクリン系	ビブラマイシン錠	ドキシサイクリン塩酸塩水和物	吸收低下 <sup>③</sup>							
	アクロマイシンVカプセル	テトラサイクリン塩酸塩	吸收阻害 <sup>③</sup>				添付文書・IF 2~4時間あけて服用すること			
	ミノサイクリン塩酸塩錠	ミノサイクリン塩酸塩	吸收阻害 <sup>③</sup>							
セフェム系	セフゾンカプセル	セフジニル	吸收低下 <sup>⑤</sup>		吸收阻害 <sup>④</sup>	添付文書・IF AI、Mg⇒本剤投与後2時間以上あける Fe⇒本剤投与後3時間以上あける				
	セフジニル細粒小児用		吸收低下 <sup>⑤</sup>		同時投与は避ける					
	バナン(錠、DS)	セフボドキシムプロキセチル	吸收阻害 <sup>⑤</sup>							
マクロライド系	ジスロマック(錠、細粒)	アジスロマイシン水和物	Cmax24%↓、AUCは有意差なし <sup>⑤</sup>		吸收低下 <sup>④</sup>					
抗結核薬	イスコチン錠	イソニアジド	吸收低下 <sup>③</sup>	吸收低下 <sup>④</sup>			添付文書・IF 服用時間をずらすことにより 相互作用は弱まるとの報告あり			

分類	薬品名	一般名	金属				備考
			AI	Mg	Fe	Ca	
抗HIV薬	アイセントレス錠	ラルテグラビルカリウム	吸收低下③			吸收低下③ (600mg製剤のみ)	添付文書・IF 前後6時間は投与しない (600mg製剤：投与後12時間以内はAI、Mg、Ca含有製剤を投与しない)
	テビケイ錠	ドルテグラビルナトリウム			吸收低下④		添付文書・IF 金属含有製剤の投与2時間前または6時間後に投与
	トリーメク配合錠	アバカビル硫酸塩 ドルテグラビルナトリウム ラミブジン					
	ピクタルビ配合錠	エムトリシタビン テノホビルアラフェナミドフル酸塩 ピクテグラビル		吸收低下③			添付文書・IF 2時間以上間隔をあけるか、食後に投与する
	ゲンボイヤ配合錠	エルビテグラビル コビンスタッフ エムトリシタビン テノホビルアラフェナミドフル酸塩		吸收低下③			添付文書・IF 2時間以上間隔をあけて投与
	ドウベイト配合錠	ドルテグラビルナトリウム ラミブジン		吸收低下④			添付文書・IF 金属含有製剤の投与2時間前または6時間後に投与
その他	メタルカプターゼカプセル	ペニシラミン	吸收低下⑤				添付文書・IF 同時投与は避ける
	メタライトカプセル	トリエンチン塩酸塩			効果減弱②		添付文書・IF 2時間以上の間隔をあける
	レボレード錠12.5mg	エルトロンボバグオラミン	吸收阻害④ (AUC70%↓)		吸收阻害④		添付文書・IF 本剤投与前4時間、投与後2時間以上あける
	ウラリット-U配合散	クエン酸カリウム・ クエン酸ナトリウム水和物	AIの吸收促進③				添付文書・IF 2時間以上間隔をあける
	クエンメット配合錠						
	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物 無水リン酸水素ニナトリウム	吸收阻害②				添付文書・IF 同時に服用させない
	リオナ錠	クエン酸第二鉄水和物	AIの吸收促進⑤				添付文書・IF 同時に服用させない
	コロネル細粒	ポリカルボフィルカルシウム		効果減弱⑥		効果減弱⑥ 高Ca血症に注意	
	デフェラシロクス顆粒	デフェラシロクス	効果減弱③				
	レスピア静注・経口液	無水カフェイン			Feの吸收低下⑥		

【機序】

①陽イオンと交換する可能性 ②消化管内で結合、吸着 ③キレート形成 ④錯体形成など ⑤機序不明 ⑥その他

参考:各種添付文書、インタビューフォーム

※当院の採用薬品を記載している。後発医薬品の採用もある場合は一般名の名称を太字で表記している

※併用に注意する薬剤として金属含有製剤が記載されているが、その機序が制酸作用のみである薬剤は記載していない

※併用に注意する薬剤として金属含有製剤が記載されているが、その機序がmilk-alkali syndromeのみである薬剤は記載していない

※数値は添付文書・IFを参照している。あくまで目安としての値である