

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【悪性黒色腫】 レジメン名称 : (免) オプジーボ (240mg/body)

レジメン説明 : 悪性黒色腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|--------|-----------------------------|----------|-----|--------|
| 01 | 末梢点滴注射 | (癌) オプジーボ点滴静注 (20mg, 100mg) | 240m g | | 240m g |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | | | | | | |
|----|--------|---|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 末梢点滴注射 | (癌) オプジーボ点滴静注 (20mg, 100mg) 生食 (100ml) 療法名: (免) オプジーボ (240mg/body) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 0.2～0.22μmのインラインフィルターで投与 | 0mg 100ml | | 09:00 | | | | | | |
| 02 | 末梢点滴注射 | 生食 (100ml) 療法名: (免) オプジーボ (240mg/body) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1 ルートキープ用 | 100ml | | 09:00 | | | | | | |