

耳鼻咽喉科【唾液腺導管癌】 レジメン名称 : トラスツズマブ・ドセタキセル継続投与

レジメン説明 : 唾液腺導管癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)【疾患限定】ハセプチン注射用 (60mg、150mg) 液無	6m g /kg		6.6m g /kg
03	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」 (20mg、80mg)	70m g /m2		75m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)【疾患限定】ハセプチン注射用 (60mg、150mg) 注射液 蒸留水注 (100ml) 生食 (250ml) 療法名:トラスツズマブ・ドセタキセル継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	0m g 100m l 250m l		オーダー時						
02	末梢点滴注射	生食 (50mL/袋) デキサート注 6.6mg/V 療法名:トラスツズマブ・ドセタキセル継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	50m l 6.6m g		オーダー時						
03	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」 (20mg、80mg) 生食 (250ml) 療法名:トラスツズマブ・ドセタキセル継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカドロン8mgを2日間(浮腫予防) 投与順序③	0m g 250m l		オーダー時						
04	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:トラスツズマブ・ドセタキセル継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で	100m l		オーダー時						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【唾液腺導管癌】 レジメン名称 : トラスツズマブ・ドセタキセル継続投与

		投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用									
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RP	オーダーコメント
03	ドセタキセル : 75歳以上は初回投与量を55mg/m ² に減量。