

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : CDDP+RT

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	100m g /m2		110m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 14.5時間で 投与経路:末梢静脈メイン1	1000m l		14:00						
02	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l			04:30					
03	末梢点滴注射	ホスアレビタ点滴静注用150m g 「NK」 生食 (250ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	150m g 250m l			08:30					
04	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL 「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	750 μ g 9.9m g			09:00					
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:CDDP+RT	0m g 500m l			09:15					

最大クール数：0クール

レジメン名称：CDDP+RT

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : CDDP+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4		
		*点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④									
06	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑤	300m l			11:15					
07	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	6.6m g 50m l				09:00	09:00	09:00		
08	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑥	500m l			3回	3回	3回			
09	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:CDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100m l			ホ-タ`時			ホ-タ`時		
10	静脈内注射	パ`リンNa`ック用 10 単位/mL 10ml 療法名:CDDP+RT 静脈内注射:	10m l			ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時			