

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【悪性黒色腫】 レジメン名称 : DAV療法

レジメン説明 : 悪性黒色腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	静脈内注射	(癌)▲ニドラン(50mg)	50m g /m2		55m g /m2
03	静脈内注射	(癌)◆オンコビン(1mg)	0.5m g /m2		2m g
05	末梢点滴注射	(癌)▲ダカルバジン(100mg)	100m g /m2		110m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	末梢点滴注射	アロシ点滴静注 ^{ハック} (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:DAV療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレ ^ビ タ ^{ント} Cap 125mg+80mg(4日分) 投与順序①	750 μ g 9.9m g		09:00						
02	静脈内注射	(癌)▲ニドラン(50mg) 生食 (20ml) 療法名:DAV療法 静脈内注射: 投与順序②	0m g 20m l		09:15						
03	静脈内注射	(癌)◆オンコビン(1mg) 生食 (20ml) 療法名:DAV療法 静脈内注射: 投与順序③	0m g 20m l		09:15						
04	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【50 mL】 療法名:DAV療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 Day6-8にデ ^カ ト ^ン 錠8mg(制吐剤) 投与順序①	9.9m g 50m l			09:00	09:00	09:00	09:00		
05	末梢点滴注射	(癌)▲ダカルバジン(100mg)	0m g		09:15	09:15	09:15	09:15	09:15		

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【悪性黒色腫】 レジメン名称 : DAV療法

	<次ページあり>	蒸留水注(20ml)	20ml								
--	----------	-------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【悪性黒色腫】

レジメン名称 : DAV療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		生食 (250ml) 療法名:DAV療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 輸液バック、ルートも遮光すること 投与順序④	250ml								
06	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:DAV療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		〆ﾀ`時	〆ﾀ`時	〆ﾀ`時	〆ﾀ`時	〆ﾀ`時		