

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : (免)キイトルーダ+CBDCA+5-FU

レジメン説明 : 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	200m g		200m g
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」 (50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g
05	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」	800m g /m2		880m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100ml) 療法名:(免)キイトルーダ+CBDCA+5-FU 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2~5μmのインラインフィルターで投与 投与順序①	0m g 100m l		10:00						
02	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名:(免)キイトルーダ+CBDCA+5-FU 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	750μ g 9.9m g 235m g		10:30						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」 (50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:(免)キイトルーダ+CBDCA+5-FU 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		11:00						
04	末梢点滴注射	生食 (50mL/袋) デキサート注 6.6mg/V 療法名:(免)キイトルーダ+CBDCA+5-FU 末梢点滴注射:	50m l 6.6m g			09:00	09:00	09:00			

最大クール数：0クール

レジメン名称：(免)キイトルーダ+CBDCa+5-FU

[illegible]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : (免)キイトルーダ+CBDCA+5-FU

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①									
05	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」 大塚生食注(1 L) 療法名:(免)キイトルーダ+CBDCA+5-FU 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 1000m l		12:00	12:00	12:00	12:00			
06	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:(免)キイトルーダ+CBDCA+5-FU 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250m l		ホ-ダ`時						
07	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免)キイトルーダ+CBDCA+5-FU 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l			ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時		