

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : TPF

レジメン説明 : 2012移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆トセタセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	60m g /m2		66m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	70m g /m2		77m g /m2
08	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」	750m g /m2		825m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 デキサート注 6.6mg/V 療法名:TPF 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 6.6m g		09:00	09:00	09:00		09:00	09:00	09:00
02	末梢点滴注射	(癌)◆トセタセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:TPF 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		09:15						
03	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:TPF 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l					05:00			
04	末梢点滴注射	プロイメンド点滴静注用15 0 m g 生食 (2 5 0ml) 療法名:TPF 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	150m g 250m l					09:00			

耳鼻咽喉科

レジメン名称：TPF

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：TPF

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
05	末梢点滴注射	アロキシ点滴静注バッグ® (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:TPF 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	750μg 9.9mg					09:30			
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:TPF 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0mg 500ml					09:45			
07	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:TPF 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	300ml					11:45			
08	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」 生食(1L) 療法名:TPF 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤'	0mg 1000ml		10:15	10:15	11:45	11:45	11:45		
09	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:TPF 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1 投与順序⑥	500ml					3回	3回	3回	
10	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:TPF 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ＜次ページあり＞	100ml		〆時	〆時	〆時	〆時	〆時	〆時	〆時

