

耳鼻咽喉科 レジメン名称 : アキシャルックス

レジメン説明 : 切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)アキシャルックス点滴静注250mg/50mL	640m g /m2		704m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ボラミン注 5mg 生食 (100ml) 療法名:アキシャルックス 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アキシャルックス投与の30-60分前に 投与順序①	3.3m g 5m g 100m l		〇-ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)アキシャルックス点滴静注250mg/50mL 療法名:アキシャルックス 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2or0.22μmのインラインフィルターを使用 輸液バッグ、ルートも遮光すること	0m g		〇-ダ`時						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:アキシャルックス 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		〇-ダ`時						

RP	オーダーコメント
02	<ul style="list-style-type: none"> ・投与順序② ・本剤は希釈して使用しない。 ・調製中は常に点滴バッグを遮光カバーで被覆する。 ・投与終了後、少なくとも4時間は患者の身体症状を観察する。 ・完全奏効が得られない場合は4週以上の間隔を空け、最大4回まで本剤を点滴静注及びレーザー光を病

耳鼻咽喉科

レジメン名称：アキラルックス

インターバル日数： 28 日

基準日： Day 1

最大クール数：4クール

RP	オーダーコメント
	巣部位に照射できる。 ・レーザー光照射は本剤投与終了から20-28時間後に実施する。 ・本剤投与後一定期間は適切な光曝露対策を実施する（詳細は適正使用ガイド参照）