

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : セツキシマブ[®] + [®] クリタセル継続投与

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	250m g /m2		275m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)◆ [®] クリタセル注「NK」(30mg, 100mg)	80m g /m2		88m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ボララミン注 5mg ファモチジン注20mg「サリイ」 生食 【 5 0 mL】 療法名:セツキシマブ [®] + [®] クリタセル継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 5m g 20m g 50m l		09:00						
02	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (2 5 0ml) 療法名:セツキシマブ [®] + [®] クリタセル継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		09:15						
03	末梢点滴注射	(癌)◆ [®] クリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:セツキシマブ [®] + [®] クリタセル継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22μm以下のインラインフィルターで投与 投与順序③	0m g 250m l		10:15						
04	末梢点滴注射	生食 (1 0 0ml) 療法名:セツキシマブ [®] + [®] クリタセル継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で	100m l		ホダ [®] 時						

最大クール数：0クール

レジメン名称：セツキシマブ⁺ハ^o クリタキセル継続投与[illegible]

