

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : CBDCA+RT

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	アロシ点滴静注バッグ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:CBDCA+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレピタントCap 125mg+80mg(2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 9.9m g		09:00						
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:CBDCA+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		09:15						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:CBDCA+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①