

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : PCE継続投与

レジメン説明 : 再発・転移頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg)	100m g /m2		110m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	2.5 (AUC)		375m g
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	250m g /m2		275m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	グラセトン点滴静注パッケ1mg/50mL「HK」 デキサート注 6.6mg/V ポララミン注 5mg ファモチジン注20mg「サワイ」 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカトロン錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序①	1m g 6.6m g 5m g 20m g		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序② 0.22μm以下のインラインフィルターで投与	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	ポララミン注 5mg 生食 【50 mL】	5m g 50m l								

耳鼻咽喉科

レジメン名称：PCE継続投与

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE継続投与

[illegible]

レジメン名称：PCE継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	末梢点滴注射	グレースロン点滴静注パック <sup>®</sup> 1mg/50mL 「HK」 デキサート注 6.6mg/V ボラミン注 5mg ファモチジン注20mg「サワイ」 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカト <sup>®</sup> ン錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序①	1m g 6.6m g 5m g 20m g		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序② 0.22μm以下のインラインフィルターで投与	0m g 250m l		オーダー時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		オーダー時						
04	末梢点滴注射	ボラミン注 5mg 生食 【50 mL】 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	5m g 50m l								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	0m g 250m l		オーダー時						
<次ページあり>											

最大クール数：0クール

レジメン名称：PCE継続投与

[illegible]

レジメン名称：PCE継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	末梢点滴注射	グラニトロン点滴静注パッケ1mg/50mL「HK」 デキサート注 6.6mg/V ポララミン注 5mg ファモチジン注20mg「サワイ」 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デキサトロン錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序①	1m g 6.6m g 5m g 20m g								
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序② 0.22μm以下のインラインフィルターで投与	0m g 250m l								
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l								
04	末梢点滴注射	ポララミン注 5mg 生食 【250mL】 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	5m g 50m l		オダ時						
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	0m g 250m l		オダ時						

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : PCE継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
		投与順序④									
06	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250ml								
07	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:PCE継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		ホダ時						