

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : CF

レジメン説明 : 2012移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	80m g /m2		88m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」	800m g /m2		880m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	末梢点滴注射	生食(1L) 療法名:CF 末梢点滴注射: *点滴時間 14.5時間で 投与経路:末梢静脈メイン1	1000m l		14:00						
02	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:CF 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l			04:30					
03	末梢点滴注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生食 (250ml) 療法名:CF 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	150m g 250m l			08:30					
04	末梢点滴注射	7-ポイント点滴静注パック (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:CF 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	750 μ g 9.9m g			09:00					
05	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 デキサート注 6.6mg/V	50m l 6.6m g				09:00	09:00	09:00	09:00	

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : CF

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		末梢点滴注射: * 点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①									
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:CF 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0mg 500ml			09:15					
07	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」 生食(1L) 療法名:CF 末梢点滴注射: * 点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	0mg 1000ml			11:15	11:15	11:15	11:15	11:15	
08	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:CF 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤'	300ml			11:15					
09	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:CF 末梢点滴注射: * 点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	500ml			3回	3回	3回			
10	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:CF 末梢点滴注射: * 点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml			ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時