

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : weeklyCDDP+RT

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	40m g /m2		44m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:weeklyCDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	ホスア`レピ`タト点滴静注用150m g 「NK」 生食 (2 5 0ml) 療法名:weeklyCDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	150m g 250m l		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	パ`ロノヒトン点滴静注バ`ック`0.75mg/50mL 「タイホ」 デキサー ト注 6.6mg/V 療法名:weeklyCDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	750 μ g 9.9m g		オ-ダ`時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0ml) 療法名:weeklyCDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l		オ-ダ`時						
05	末梢点滴注射	マンニットールS注射液 (300mL/袋)	300m l		オ-ダ`時						

耳鼻咽喉科

レジメン名称: weeklyCDDP+RT

[illegible]

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 7クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : weeklyCDDP+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤									
06	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:weeklyCDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6mg 50ml			〆-タ`時	〆-タ`時	〆-タ`時			
07	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:weeklyCDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	500ml		3回	3回	3回				
08	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:weeklyCDDP+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		〆-タ`時			〆-タ`時			
09	静脈内注射	ヘ`リンNa`ック用 10 単位/mL 10ml 療法名:weeklyCDDP+RT 静脈内注射:	10ml		〆-タ`時	〆-タ`時	〆-タ`時				