

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	400m g /m2		440m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」	800m g /m2		880m g /m2
10	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	250m g /m2		275m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	アロキシ点滴静注バッグ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレビタントCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序①	750 μ g 9.9m g		10:45						
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250mL) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		11:00						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l			09:00		09:00	09:00		
04	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入	50m l 5m g 6.6m g				09:00				

最大クール数：0クール

レジメン名称：cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入

<次ページあり>

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		*点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①									
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (500ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0mg 500ml				09:15				
06	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アービタックス経過観察用 投与順序③	100ml				11:15				
07	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000mg 「トローワ」 生食(1L) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0mg 1000ml		12:00	12:00	12:15	12:15	12:15		
08	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1	100ml							12:15	
09	末梢点滴注射	生食 【50mL】 ボララミン注 5mg 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50ml 5mg								
10	末梢点滴注射 ＜次ページあり＞	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml)	0mg 250ml								

最大クール数：0クール

レジメン名称：cetuximab+CBDCa+5-FU初回導入

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	末梢点滴注射	7-エポキシ点滴静注パッケ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 7-エポキシパッケCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序①	750 $\mu$ g 9.9m g								
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【50 mL】 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	生食 【50 mL】 ボララミン注 5mg デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g 6.6m g								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (500ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 500m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (1000ml)	100m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17				
01	末梢点滴注射	7-エポキシ点滴静注バッグ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 7-エポキシCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序①	750 $\mu$ g 9.9m g								
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【50 mL】 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	生食 【50 mL】 ボララミン注 5mg デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g 6.6m g								
05	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (500ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 500m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (1000ml)	100m l								

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17				
		療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アービタックス経過観察用 投与順序③									
07	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」 生食(1L) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 1000m l								
08	末梢点滴注射	生食 (1 0 0 ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1	100m l								
09	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 ボララミン注 5mg 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g				09:00				
10	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (2 5 0 ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l				09:15				
11	末梢点滴注射	生食 (1 0 0 ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l				ホダ時				