

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g
06	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	250m g /m2		275m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」	800m g /m2		880m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	アキシ点滴静注 ^{ハック} (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレキントCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序①	750 μ g 9.9m g		10:45						
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		11:00						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【50 mL】 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l			09:00		09:00	09:00		
04	末梢点滴注射	生食 【50 mL】 ボララミン注 5mg デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射:	50m l 5m g 6.6m g				09:00				

最大クール数：0クール

レジメン名称：cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	末梢点滴注射	7-エポキシ点滴静注パッケ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 7-エポキシパッケCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序①	750 μ g 9.9m g								
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250mL) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g 6.6m g								
05	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g				09:00				
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	(癌)アービタックス注100mg	0m g				09:15				

最大クール数：0クール

レジメン名称：cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17				
01	末梢点滴注射	7ロキシ点滴静注パッケ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 7プロビタントCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序①	750 μ g 9.9m g								
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
04	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 ボララミン注 5mg デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g 6.6m g								
05	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 ボララミン注 5mg 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g				09:00				
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	(癌)アービタックス注100mg	0m g				09:15				

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17				
		生食 (250ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	250ml								
07	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」 生食(1L) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0mg 1000ml								
08	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1	100ml								
09	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:cetuximab+CBDCA+5-FU維持投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml				ホダ時				