

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CF継続投与

レジメン説明 : 2012移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	80m g /m2		88m g /m2
09	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	250m g /m2		275m g /m2
10	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」	800m g /m2		880m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	末梢点滴注射	生食(1L) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15時間で 投与経路:末梢静脈メイン1	1000m l		14:00						
02	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l			05:00					
03	末梢点滴注射	プロイメンド点滴静注用150mg 生食(250ml) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	150m g 250m l			09:00					
04	末梢点滴注射	デキササート注 6.6mg/V アキシ点滴静注ハック (0.75mg/50mL) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	9.9m g 750 μ g			09:30					
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	0m g			09:45					

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CF継続投与

	<次ページあり>	生食 (500ml)	500ml								
--	----------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CF継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
		療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④									
06	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l				09:00		09:00	09:00	
07	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g 6.6m g					11:45			
08	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g								
09	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l					12:00			
10	末梢点滴注射 <次ページあり>	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」 生食(1L) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射:	0m g 1000m l			11:45	11:45	13:00	13:00	13:00	

レジメン名称：cetuximab+CF継続投与

[illegible]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CF継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13
		投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①									
07	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g 6.6m g								
08	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g					09:00			
09	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l					09:15			
10	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000mg 「トーフ」 生食(1L) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	0m g 1000m l								
11	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤'	300m l								
12	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック(500ml)	500m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：cetuximab+CF継続投与

[illegible]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CF継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day14	Day15	Day16	Day17			
		投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①									
07	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg デキサート注 6.6mg/V 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g 6.6m g								
08	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 ボララミン注 5mg 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 5m g					09:00			
09	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (250ml) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l					09:15			
10	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000mg 「トーフ」 生食(1L) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	0m g 1000m l								
11	末梢点滴注射	20%マンニトール注射液「YD」 (300mL/袋) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤'	300m l								
12	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック(500ml)	500m l								

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : cetuximab+CF継続投与

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day14	Day15	Day16	Day17			
		療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥									
13	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:cetuximab+CF継続投与 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml					オ-ダ ^レ 時			