

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : セツキシマブ<sup>®</sup>+パ<sup>®</sup>クリタセル初回導入

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg	400m g /m2		440m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)◆パ <sup>®</sup> クリタセル注「NK」(30mg, 100mg)	80m g /m2		88m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ボララミン注 5mg ファモチジン注20mg「サリ」 生食 【 5 0 mL】 療法名:セツキシマブ <sup>®</sup> +パ <sup>®</sup> クリタセル初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 5m g 20m g 50m l		09:00						
02	末梢点滴注射	(癌)アービタックス注100mg 生食 (5 0 0ml) 療法名:セツキシマブ <sup>®</sup> +パ <sup>®</sup> クリタセル初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 500m l		09:15						
03	末梢点滴注射	生食 (1 0 0ml) 療法名:セツキシマブ <sup>®</sup> +パ <sup>®</sup> クリタセル初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アービタックス経過観察用 投与順序③	100m l		11:15						
04	末梢点滴注射	(癌)◆パ <sup>®</sup> クリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:セツキシマブ <sup>®</sup> +パ <sup>®</sup> クリタセル初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で	0m g 250m l		12:15						

最大クール数：0クール

レジメン名称：セツキシマブ<sup>®</sup>+ハ<sup>®</sup> クリタセル初回導入

[illegible]

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : セツキシマブ<sup>®</sup> + <sup>α</sup> クリタセル初回導入

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		0.22 $\mu$ m以下のインラインフィルターで投与 投与順序④									
05	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:セツキシマブ <sup>®</sup> + <sup>α</sup> クリタセル初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		ホダ <sup>®</sup> 時						