

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : (免)キイトルーダ+FP

レジメン説明 : 再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	200m g		200m g
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	80m g /m2		88m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーワ」	800m g /m2		880m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 15時間で 投与経路:末梢静脈メイン1	1000m l		15:00						
02	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l			06:00					
03	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (1 0 0ml) 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2〜5μmのインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 100m l			10:00					
04	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注 (235mg/10mL) 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	750μ g 9.9m g 235m g			10:30					

最大クール数：0クール

レジメン名称：(免)キイトルーダ+FP

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：(免)キイトルーダ+FP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0mg 500ml			11:00					
06	末梢点滴注射	生食 (50mL/袋) デキサート注 6.6mg/V 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50ml 6.6mg				09:00	09:00	09:00		
07	末梢点滴注射	(癌)▲フルオロウラシル注 1000mg 「トーワ」 大塚生食注(1L) 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	0mg 1000ml			13:00	13:00	13:00	13:00		
08	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤'	300ml			13:00					
09	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	500ml			3回	3回	3回			
10	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1	250ml			オーダー時					

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 0

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : (免)キイトルーダ+FP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	
		ルートキープ用									
11	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免)キイトルーダ+FP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml				ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	ホ-ダ`時	