

耳鼻咽喉科【唾液腺導管癌】 レジメン名称 : トラスツズマブ・ドセタキセル初回導入

レジメン説明 : 唾液腺導管癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)【疾患限定】ハセプ <sup>®</sup> チン注射用 (60mg、150mg) 液無	8m g /kg		8.8m g /kg
03	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」 (20mg, 80mg)	70m g /m2		75m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)【疾患限定】ハセプ <sup>®</sup> チン注射用 (60mg、150mg) 注射液 蒸留水注 (1 0 0 ml) 生食 (2 5 0 ml) 療法名: トラスツズマブ・ドセタキセル初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 90分で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 投与順序①	0m g 100m l 250m l		朝 <sup>7</sup> 時						
02	末梢点滴注射	生食 (5 0 mL/袋) デキサート注 6.6mg/V 療法名: トラスツズマブ・ドセタキセル初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 投与順序②	50m l 6.6m g		朝 <sup>7</sup> 時						
03	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」 (20mg, 80mg) 生食 (2 5 0 ml) 療法名: トラスツズマブ・ドセタキセル初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 デカドロン8mgを2日間(浮腫予防) 投与順序③	0m g 250m l		朝 <sup>7</sup> 時						
04	末梢点滴注射	生食 (1 0 0 ml) 療法名: トラスツズマブ・ドセタキセル初回導入 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で	100m l		朝 <sup>7</sup> 時						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【唾液腺導管癌】 レジメン名称 : トラスツズマブ・ドセタキセル初回導入

		投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用									
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RP	オーダーコメント
03	ドセタキセル : 75歳以上は初回投与量を55mg/m <sup>2</sup> に減量。