

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵【放射線併用【なし】レジメン名称 : bi-weekly GEM

レジメン説明 : 胆道癌、胆管細胞癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシチン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 デキサート注 6.6mg/V 療法名:bi-weekly GEM 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 6.6m g		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシチン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(1 0 0ml) 療法名:bi-weekly GEM 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	生食 (1 0 0ml) 療法名:bi-weekly GEM 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オ-ダ`時						