

皮膚科 【エクリン汗孔癌】 レジメン名称 : 【適外】 ドセタキセル (4週毎)

レジメン説明 : エクリン汗孔癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	60m g /m2		66m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 (50mL/袋) デキサート注 6.6mg/V 療法名:【適外】ドセタキセル (4週毎) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 6.6m g		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (250ml) 療法名:【適外】ドセタキセル (4週毎) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカドロン8mgを2日間(浮腫予防) 投与順序②	0m g 250m l		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:【適外】ドセタキセル (4週毎) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オ-ダ`時						