

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科 レジメン名称 : 天疱瘡用リツキサン

レジメン説明 : 天疱瘡

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌) リツキサン(100mg, 500mg)	1000m g		1000m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 (50mL/袋) ポラミン注 5mg 療法名:天疱瘡用リツキサン 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アセトアミノフェンの内服が必要です 投与順序①	50m l 5m g		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌) リツキサン(100mg, 500mg) 生食 (500mL) 療法名:天疱瘡用リツキサン 末梢点滴注射: *点滴時間 4.5時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 500m l		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	生食 (100mL) 療法名:天疱瘡用リツキサン 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オ-ダ`時						

RP	オーダーコメント
01	アセトアミノフェン、ポラミン注はリツキサン投与約30分前に投与すること
02	【重要】投与速度は添付文書参照のこと！！