

皮膚科 【基底細胞癌】 レジメン名称 : 【適外】 シスプラチン+ドキソルビシン療法

レジメン説明 : 基底細胞癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	末梢点滴注射	(癌)★ドキソルビシン塩酸塩「NK」(50mg)	30m g /m2		33m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	25m g /m2		27.5m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) KCL注20mEqキット 療法名:【適外】シスプラチン+ドキソルビシン療 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l 20m l		オ-ダ`時	オ-ダ`時	オ-ダ`時				
02	末梢点滴注射	ホスアプレピ`タ点点滴静注用150m g 「NK」 生食 (250ml) 療法名:【適外】シスプラチン+ドキソルビシン療 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	150m g 250m l		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	パ`ロ/セトロン点点滴静注`バ`ッ` 0.75mg/50mL 「タイ`」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:【適外】シスプラチン+ドキソルビシン療 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	750`μ g 9.9m g		オ-ダ`時						
04	末梢点滴注射	生食 (50mL/袋) デキサート注 6.6mg/V 療法名:【適外】シスプラチン+ドキソルビシン療 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	50m l 6.6m g			オ-ダ`時	オ-ダ`時				

皮膚科 【基底細胞癌】

レジメン名称 : 【適外】シスプラチン+ドキソルビシン療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		day4-6 テ`ホ`ロ`ン8mg考慮									
05	末梢点滴注射	(癌)★ド`キソ`ルビ`シン塩酸塩「NK」(50mg) 生食 (100ml) 療法名:【適外】シスプラチン+ドキソルビシン療 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0mg 100ml		ホ`ダ`時						
06	末梢点滴注射	マンニトールS注射液(300mL/袋) 療法名:【適外】シスプラチン+ドキソルビシン療 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	300ml		ホ`ダ`時	ホ`ダ`時	ホ`ダ`時				
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg,50mg 生食 (500ml) 療法名:【適外】シスプラチン+ドキソルビシン療 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	0mg 500ml		ホ`ダ`時	ホ`ダ`時	ホ`ダ`時				
08	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:【適外】シスプラチン+ドキソルビシン療 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑦	500ml		2回	2回	2回				
09	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:【適外】シスプラチン+ドキソルビシン療 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		ホ`ダ`時	ホ`ダ`時	ホ`ダ`時				