

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科

レジメン名称 : DAV-Feron

レジメン説明 : 悪性黒色腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)▲ダカルバジン(100mg)	80mg /m2		88mg /m2
04	静脈内注射	(癌)▲ニドラン(50mg)	50mg /m2		55mg /m2
05	静脈内注射	(癌)◆オンコビン(1mg)	0.5mg /m2		2mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	末梢点滴注射	アロシ点滴静注バッグ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:DAV-Feron 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレタントCap 125mg+80mg(4日分) day6-8にデキサート錠8mgを考慮	750 μ g 9.9mg		ホダ時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:DAV-Feron 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6mg 50m l			ホダ時	ホダ時	ホダ時	ホダ時		
03	末梢点滴注射	(癌)▲ダカルバジン(100mg) 蒸留水注(20ml) 生食 (250ml) 療法名:DAV-Feron 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 輸液バッグ、ルートも遮光すること 投与順序②	0mg 20m l 250m l		ホダ時	ホダ時	ホダ時	ホダ時	ホダ時		
04	静脈内注射	(癌)▲ニドラン(50mg) 生食 (20ml) 療法名:DAV-Feron	0mg 20m l		ホダ時						

レジメン名称：DAV-Feron

[illegible]

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科

レジメン名称 : DAV-Feron

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		投与順序③									
05	静脈内注射	(癌)◆オンコビン(1mg) 生食 (20ml) 療法名:DAV-Feron 静脈内注射: 投与順序④	0mg 20ml		〇-タ`時						
06	局所・病巣内注射	フェロン(300万IU) 塩酸ブ`ロ`ン注「ト`」(5mg/1ml) 療法名:DAV-Feron 局所・病巣内薬剤注射:	300万U 5mg		〇-タ`時	〇-タ`時	〇-タ`時	〇-タ`時	〇-タ`時		
07	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:DAV-Feron 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		〇-タ`時	〇-タ`時	〇-タ`時	〇-タ`時	〇-タ`時		

RP	オーダーコメント
01	投与順序①