

最大クール数：0クール

使用する抗がん剤:

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称: weekly パクリタキセル(100mg/m²)

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：weekly パクリタキセル(100mg/m²)

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称: weekly パクリタキセル(100mg/m²)

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称: weekly パクリタキセル(100mg/m²)

[illegible]

インターバル日数 : 56 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科 【血管肉腫】

レジメン名称 : weekly パクリタキセル(100mg/m²)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day36						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V ファモチジン注20mg「サリ」 ボララミン注 5mg 生食 【 5 0 mL】 療法名:weekly パクリタキセル(100mg/m ²) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 20m g 5m g 50m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタキセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:weekly パクリタキセル(100mg/m ²) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22μm以下のインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	生食 (1 0 0ml) 療法名:weekly パクリタキセル(100mg/m ²) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホダ時						