

泌尿器科 【陰茎癌】 レジメン名称 : 【適外】 TIP (陰茎癌)

レジメン説明 : 陰茎癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg)	175m g /m2		192.5m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	25m g /m2		27.5m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)ウロミテキサン(400mg/4ml) レジメ	240m g /m2		264m g /m2
08	末梢点滴注射	(癌)▲イホマイド(1g)	1.2 g /m2		1.32 g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注パック ^{0.75mg/50mL} 「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V ファモチジン静注液20mg「サリ」(20mg/20mL) ポララミン注 5mg 療法名:【適外】TIP(陰茎癌) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレキントCap 125mg+80mg(2日分) day5, 6アプレキント錠8mg2日間考慮	750 μ g 19.8m g 20m g 5m g		08:00						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:【適外】TIP(陰茎癌) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l			08:00	08:00	08:00			
03	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (500mL) 療法名:【適外】TIP(陰茎癌) 末梢点滴注射: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22 μ m以下のインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 500m l		08:15						
04	末梢点滴注射	生食 (500mL)	500m l		11:15	08:15	08:15				

泌尿器科 【陰茎癌】

レジメン名称 : 【適外】 TIP (陰茎癌)

	<次ページあり>	硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml)	8m l								
--	----------	-----------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

最大クール数：6クール

レジメン名称：【適外】TIP（陰茎癌）

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		療法名：【適外】TIP（陰茎癌） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン1側管 投与順序③									
05	末梢点滴注射	マンニトールS注射液（300mL/袋） 療法名：【適外】TIP（陰茎癌） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン1側管 投与順序④	300m l		13:15	10:15	10:15				
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食（500ml） 療法名：【適外】TIP（陰茎癌） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	0mg 500ml		15:15	12:15	12:15				
07	末梢点滴注射	(癌)ウロミテキサン（400mg/4ml） 生食（100ml） 療法名：【適外】TIP（陰茎癌） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路：末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	0mg 100ml		17:15 21:45	01:45 14:15 18:45 22:45	14:15 18:45 22:45				
08	末梢点滴注射	(癌)▲イホマイド（1g） 生食（500ml） 療法名：【適外】TIP（陰茎癌） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	0g 500ml		17:45	14:45	14:45				
09	末梢点滴注射	ソルデム3A（500ml） メイロン 7% 20mL 療法名：【適外】TIP（陰茎癌） 末梢点滴注射： ＊点滴時間 5時間で 投与経路：末梢静脈メイン1側管	500ml 40ml		1回	1回	1回				

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 6クール

泌尿器科 【陰茎癌】 レジメン名称 : 【適外】 TIP (陰茎癌)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		投与順序⑦									
10	末梢点滴注射	ラクテック (5 0 0ml) 療法名 : 【適外】 TIP (陰茎癌) 末梢点滴注射 : * 点滴時間 5時間で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑧	500m l		2回	2回	2回	2回			
11	末梢点滴注射	生食 (2 5 0ml) 療法名 : 【適外】 TIP (陰茎癌) 末梢点滴注射 : * 点滴時間 30分で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	250m l		08:00						
12	末梢点滴注射	生食 (1 0 0ml) 療法名 : 【適外】 TIP (陰茎癌) 末梢点滴注射 : * 点滴時間 30分で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100m l			08:00	08:00				

RP	オーダーコメント
01	投与順序①