

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

泌尿器科

レジメン名称 : (免) オブジーボ+ヤーボイ (計4回まで)

レジメン説明 : 腎細胞癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)オブジーボ点滴静注 (20mg, 120mg, 240mg)	240m g		240m g
02	末梢点滴注射	(癌)ヤーボイ点滴静注液 (20mg, 50mg)	1m g /kg		1.1m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)オブジーボ点滴静注 (20mg, 120mg, 240mg) 生食 (100ml) 療法名:(免)オブジーボ+ヤーボイ (計4回まで) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序① 0.2～0.22μmのインラインフィルターで投与	0m g 100m l		10:00						
02	末梢点滴注射	(癌)ヤーボイ点滴静注液 (20mg, 50mg) 生食 (50mL/袋) 療法名:(免)オブジーボ+ヤーボイ (計4回まで) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 最終液量計30mLになるように調製 最終濃度1～4mg/mLにする	0m g 30m l		11:00						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免)オブジーボ+ヤーボイ (計4回まで) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1	100m l		ホダ時						

RP	オーダーコメント
01	オブジーボ投与終了後30分以上あけてヤーボイを投与
02	・オブジーボ投与終了後30分以上あけてヤーボイを投与 ・0.2～1.2μmのインラインフィルターで投与 ・投与順序②
03	ルートキープ時と、オブジーボ投与終了後30分の経過観察時と、ヤーボイ投与終了後のルートフラッ

泌尿器科

インターバル日数： 21 日 基準日： Day 1 印刷日時： 2023-06-02 16:04:39
レジメン名称：(免) オプジーボ+ヤーボイ（計4回まで） 最大クール数：0クール

RP	オーダーコメント
	シュ時に使用