

泌尿器科

レジメン名称 : GC(インターバル21日)

レジメン説明 : 尿路上皮癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	70m g /m2		77m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l			06:00					
02	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイバシ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 day2〜7パレドニド125mg+80mg(2日) 投与順序②	750 μ g 9.9m g			10:00					
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l		10:15		10:00	10:00	10:00		
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管	0m g 100m l		10:30						

最大クール数：0クール

レジメン名称：GC(インターバル21日)

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：GC(インターバル21日)

[illegible]

泌尿器科

レジメン名称： GC(インターバル21日)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL「タイ妙」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 day2～7ﾌﾟﾚﾐｴﾝﾄ125mg+80mg(2日) 投与順序②	750 μ g 9.9m g								
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (5 0 mL/袋) 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	6.6m g 50m l		10:15						
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタレン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(1 0 0 ml) 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	0m g 100m l		10:30						
05	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	300m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:GC(インターバル21日)	0m g 500m l								

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

泌尿器科

レジメン名称 : GC(インターバル21日)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④									
07	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑤	500ml								
08	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:GC(インターバル21日) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100ml		10:15						
09	ヘパリンロック	ヘパリンNaロック用 10 単位/mL 10ml 療法名:GC(インターバル21日) ヘパリンロック: 末梢静脈 ヘパリンロック	10ml								