

レジメン名称：パドセブ

AUC計算式 : 男性用: $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用: $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|--------|----------------------------|-------------|-----|--------------|
| 01 | 末梢点滴注射 | (癌)▲パドセブ点滴静注用 (20mg, 30mg) | 1.25m g /kg | | 1.375m g /kg |

[illegible]

泌尿器科

レジメン名称：パドセブ

[illegible]

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

泌尿器科

レジメン名称 : パドセブ

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day15 | | | | | | |
|----|--------|---|--------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 末梢点滴注射 | (癌)▲パドセブ点滴静注用 (20mg, 30mg) 蒸留水注 (1 0 0ml) 生食 (1 0 0ml) 療法名:パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 最終濃度は0.3～4mg/mL 最大125mg/body | 0m g 100m l 100m l | | オ-ダ`時 | | | | | | |
| 02 | 末梢点滴注射 | 生食 (1 0 0ml) 療法名:パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用 | 100m l | | オ-ダ`時 | | | | | | |