

レジメン名称：GEM単剤

AUC計算式 : 男性用: $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用: $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタソン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：GEM単剤

[illegible]

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : GEM単剤

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GEM単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 6.6m g		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタ`ン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(1 0 0 ml) 療法名:GEM単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		12:00						
03	末梢点滴注射	生食 (1 0 0 ml) 療法名:GEM単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オ-ダ`時						