

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : BEP

レジメン説明 : 胚細胞腫

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	20m g /m2		22m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」	100m g /m2		110m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)ブレオ(1 5mg)	20m g /m2		30m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l		1回	1回	1回	1回	1回		
02	末梢点滴注射	アロシ点滴静注ハック (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレピタトCap 125mg+80mg(4日分) Day6-8にデカトロン錠8mg(制吐剤)	750 μ g 9.9m g		ホダ`時						
03	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 デキサート注 6.6mg/V 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	50m l 6.6m g			ホダ`時	ホダ`時	ホダ`時	ホダ`時		
04	末梢点滴注射	マンニトールS注射液(300mL/袋) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で	300m l		ホダ`時	ホダ`時	ホダ`時	ホダ`時	ホダ`時		

最大クール数：0クール

レジメン名称：BEP

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : BEP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	7αヒ点滴静注パッケ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 7αヒ点滴Cap 125mg+80mg(4日分) Day6-8にテカトロン錠8mg(制吐剤)	750 μ g 9.9m g								
03	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 デキサート注 6.6mg/V 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	50m l 6.6m g								
04	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	300m l								
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l								
06	末梢点滴注射 ＜次ページあり＞	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」 生食 (500ml)	0m g 500m l								

最大クール数：0クール

レジメン名称：BEP

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : BEP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16					
01	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l								
02	末梢点滴注射	7αヒドロキシ点滴静注パッケ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 7αヒドロキシCap 125mg+80mg(4日分) Day6-8にテカトロン錠8mg(制吐剤)	750 μ g 9.9m g								
03	末梢点滴注射	生食 【 50 mL】 デキサート注 6.6mg/V 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	50m l 6.6m g								
04	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	300m l								
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l								
06	末梢点滴注射 ＜次ページあり＞	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」 生食 (500ml)	0m g 500m l								

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : BEP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16					
		療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤									
07	末梢点滴注射	(癌)ブレオ(15mg) 生食 (100ml) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	0mg 100ml			16:00					
08	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑦	500ml								
09	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250ml								
10	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:BEP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml			オーダー時					

RP	オーダーコメント
02	投与順序②