

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : tri-weekly TC

レジメン説明 : 卵巣癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)【 経 用】フアモチジン注20mg「 ホ ハラ」	20m g		20m g
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg)	175m g /m2		192.5m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	6 (AUC)		900m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	アロキシ点滴静注 パ ック ク (0.75mg/50mL) (癌)【 経 用】フアモチジン注20mg「 ホ ハラ」 デキサート注 6.6mg/V ボララミン注 5mg 療法名:tri-weekly TC 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレ ビ タントCap 125mg+80mg(2日分) テ カ トロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 0m g 19.8m g 5m g		ホ ダ 時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (500ml) 療法名:tri-weekly TC 末梢点滴注射: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22 μ m以下のインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 500m l		10:00						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:tri-weekly TC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		13:00						
04	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:tri-weekly TC	250m l		ホ ダ 時						

レジメン名称: tri-weekly TC

[illegible]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : tri-weekly TC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		*点滴速度 30ml/h 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用									

RP	オーダーコメント
01	投与順序①