

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 21クール

産婦人科

レジメン名称 : Bev+Olaparib

レジメン説明 : 卵巣癌（相同組換え修復欠損を有するものの初回治療後の維持療法として）

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)ベ`バ`シ`マ` BS点滴静注「第一三共」 (100mg, 400mg)	15m g /kg		16.5m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)ベ`バ`シ`マ` BS点滴静注「第一三共」 (100mg, 400mg) 生食 (100ml) 療法名:Bev+Olaparib 末梢点滴注射: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 2回目60分、3回目以降30分も可 リムパーザ600mg/日内服	0mg 100ml		オーダー時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:Bev+Olaparib 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序① アバスチンは治療期の投与と合わせて計21サイクル投与、リムパーザは2年間内服。