

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : weekly TP

レジメン説明 : 子宮頸癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|--------|------------------------------|-----------|-----|-------------|
| 02 | 末梢点滴注射 | (癌)【経用】フアモチジン注20mg「オハラ」 | 20m g | | 20m g |
| 03 | 末梢点滴注射 | (癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) | 70m g /m2 | | 77m g /m2 |
| 05 | 末梢点滴注射 | (癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg | 35m g /m2 | | 38.5m g /m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | Day6 | Day7 |
|----|--------|--|-----------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 01 | 末梢点滴注射 | 生食 (1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:weekly TP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序① | 1000m l 8m l | | 1回 | | | | | | |
| 02 | 末梢点滴注射 | アロシ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ (0.75mg/50mL) (癌)【経用】フアモチジン注20mg「オハラ」 デキサート注 6.6mg/V ボララミン注 5mg 療法名:weekly TP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分) デカトロン8mg, day2-4, 9-11, 16-18 | 750 μ g 0m g 9.9m g 5m g | | オダ時 | | | | | | |
| 03 | 末梢点滴注射 | (癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (250ml) 療法名:weekly TP 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22 μ m以下のインラインフィルターで投与 投与順序③ | 0m g 250m l | | 10:00 | | | | | | |
| 04 | 末梢点滴注射 | マンニトールS注射液 (300mL/袋) | 300m l | | 11:00 | | | | | | |

最大クール数：0クール

レジメン名称：weekly TP

[illegible]

レジメン名称：weekly TP

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day8 | Day9 | Day10 | Day11 | Day12 | Day13 | Day14 |
|----|------------------------|---|----------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01 | 末梢点滴注射 | 生食（1L） 硫酸Mg補正液1mEq/ml（20ml） 療法名:weekly TP 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序① | 1000m l 8m l | | 1回 | | | | | | |
| 02 | 末梢点滴注射 | アロシ点滴静注パック（0.75mg/50mL） （癌）【ケ用】 ファモチジン注20mg「オーハラ」 デキサート注 6.6mg/V ポララミン注 5mg 療法名:weekly TP 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレビントCap 125mg+80mg（2日分） デカトロン8mg, day2-4, 9-11, 16-18 | 750μ g 0m g 9.9m g 5m g | | オーダ時 | | | | | | |
| 03 | 末梢点滴注射 | （癌）◆パクリタセル注「NK」（30mg, 100mg） 生食（250ml） 療法名:weekly TP 末梢点滴注射： ＊点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22μ m以下のインラインフィルターで投与 投与順序③ | 0m g 250m l | | 10:00 | | | | | | |
| 04 | 末梢点滴注射 | マンニトールS注射液（300mL/袋） 療法名:weekly TP 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④ | 300m l | | 11:00 | | | | | | |
| 05 | 末梢点滴注射 ＜次ページあり＞ | （癌）▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食（500ml） 療法名:weekly TP 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 | 0m g 500m l | | 13:00 | | | | | | |

最大クール数：0クール

レジメン名称：weekly TP

[illegible]

最大クール数：0クール

<次ページあり>

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : weekly TP

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day15 | Day16 | Day17 | | | | |
|----|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| | | 投与順序⑤ | | | | | | | | | |
| 06 | 末梢点滴注射 | ラクテック(500ml) 療法名:weekly TP 末梢点滴注射: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥ | 500ml | | 2回 | | | | | | |
| 07 | 末梢点滴注射 | ラクテック(500ml) 療法名:weekly TP 末梢点滴注射: *点滴時間 8時間で 投与経路:末梢静脈メイン1 | 500ml | | | 3回 | 3回 | | | | |
| 08 | 末梢点滴注射 | 生食(250ml) 療法名:weekly TP 末梢点滴注射: *点滴速度 50ml/h 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用 | 250ml | | オーダー時 | | | | | | |

| RP | オーダーコメント |
|----|----------|
| 02 | 投与順序② |