

産婦人科 【子宮頸部胃型腺癌】レジメン名称 : 【適外】 DC+Bev (子宮頸部胃型腺癌)

レジメン説明 : 子宮頸部胃型腺癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	70m g /m2		75m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g
04	末梢点滴注射	(癌)アバスチン注(100mg, 400mg)	15m g /kg		16.5m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注バッグ <sup>0.75mg/50mL</sup> 「タイホ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:【適外】DC+Bev (子宮頸部胃型腺癌) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分) デカトロン錠8mg 3日間(浮腫・制吐)	750 μ g 9.9m g		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (250ml) 療法名:【適外】DC+Bev (子宮頸部胃型腺癌) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:【適外】DC+Bev (子宮頸部胃型腺癌) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)アバスチン注(100mg, 400mg) 生食 (100ml) 療法名:【適外】DC+Bev (子宮頸部胃型腺癌) 末梢点滴注射: *点滴時間 90分で	0m g 100m l		ホダ時						

最大クール数：0クール

	＜次ページあり＞	投与経路:末梢静脈メイン1側管								
--	----------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

産婦人科 【子宮頸部胃型腺癌】レジメン名称 : 【適外】 DC+Bev (子宮頸部胃型腺癌)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		2回目60分、3回目以降30分も可 投与順序④									
05	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名: 【適外】 DC+Bev (子宮頸部胃型腺癌) 末梢点滴注射: * 点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①