

産婦人科

レジメン名称 : DC+Bev

レジメン説明 : 卵巣癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	75m g /m2		75m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	6 (AUC)		900m g
04	末梢点滴注射	(癌)ベバシマブBS点滴静注「第一三共」(100mg, 400mg)	15m g /kg		16.5m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注 ^{ベック} 0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:DC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレビタ ^タ ntCap 125mg+80mg(2日分) デカトロン錠8mg 3日間(浮腫・制吐)	750 μ g 9.9m g		オ ^ダ 時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆ドセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (250m l) 療法名:DC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		オ ^ダ 時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250m l) 療法名:DC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		オ ^ダ 時						
04	末梢点滴注射	(癌)ベバシマブBS点滴静注「第一三共」(100mg, 400m 生食 (100m l) 療法名:DC+Bev 末梢点滴注射:	0m g 100m l		オ ^ダ 時						

最大クール数：0クール

レジメン名称：DC+Bev

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

産婦人科 レジメン名称 : DC+Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		2回目60分、3回目以降30分も可 投与順序④									
05	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:DC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①